

- го Алтая. - В кн.: Фауна и экология растительноядных и хищных насекомых Сибири. Новосибирск: Наука, 1980, с. 52-121.
- Гиляров М.С. Закономерности приспособлений членистоногих к жизни на суше. М.: Наука, 1970. 275 с.
- Даричева М.А., Ключко З.Ф., Сакчиев А. Новый вредитель томатов в закрытом грунте Туркмении. - Информ. листок ТуркменНИИНТИ, 1982, № 132, с. 1-4.
- Золотаренко Г.С. Совки-металловидки рода *Plusia* O. (Lepidoptera, Phytometrinae) лесостепной зоны Западной Сибири. - В кн.: Фауна и экология членистоногих Сибири. Новосибирск: Наука, 1966, с. 174-177.
- Золотаренко Г.С. К фауне совок (Lepidoptera, Noctuidae) Восточного Саяна. - Тр. гос. запов. "Столбы", 1969, вып. 7, с. 204-219.
- Золотаренко Г.С., Коршунов Ю.П. О фауне и биотопическом размещении чешуекрылых Среднего Приобья. - Тр. Томск. ун-та, Томск, 1963, т. 152, с. 330-342.
- Ивинскис П.П. 138 новых для Литовской ССР видов чешуекрылых, обнаруженных в 1968-1982 гг. - В кн.: Новые и редкие для Литовской ССР виды насекомых. Вильнюс, 1982, с. 28-47.
- Искаков Н.С. Совки - вредители капусты. - Защита растений, 1966, № 2, с. 46-47.
- Ключко З.Ф. Совки (Lepidoptera, Noctuidae) степных заповедников Украины. - Тр. ВЭО, 1973, т. 56, с. 265-273.
- Ключко З.Ф. Фауна Украины. Совки квадрифиоидного комплексу. Т. 16, вып. 6. Киев: Наукова думка, 1978. 412 с.
- Криштофович А.Н. Развитие ботанико-географических провинций Северного полушария с начала третичного периода. - В кн.: Вопросы геологии Азии. Вып. 2. М., 1955, с. 824-844.
- Кузнецов В.И. Материалы по фауне и биологии чешуекрылых (Lepidoptera) Западного Копет-Дага. - Тр. Зоол. ин-та АН СССР, 1960, т. 27, с. 11-93.
- Полтавский А.Н., Рыбин С.Н. Совки (Lepidoptera, Noctuidae) Северной Осетии. - Энтомол. обзор., 1980, т. 59, № 1, с. 98-106.
- Райгородская И.А. Обзор чешуекрылых (Lepidoptera) - вредителей хвойных лесов в Прибайкалье. - Энтомол. обзор., 1967, т. 46, № 2, с. 311-318.
- Ремм Х.Я., Вийдалепп Я.Р. К фауне высших чешуекрылых Ясхана и долины Узоя. - В кн.: Гидробиологические исследования. Т. 10. Тарту, 1981, с. 28-32.
- Свиридов А.В. К фауне совок (Lepidoptera, Noctuidae) Бадхыза. - Изв. АН ТССР, сер. биол. наук, 1971, № 5, с. 43-48.
- Сироткин М.И. Чешуекрылые (Macrolepidoptera) Московской и Калужской областей РСФСР. - Тр. Всесоюз. энтомол. о-ва АН СССР, М., 1976. 167 с.
- Сухарева И.Л. К фауне совок (Lepidoptera, Noctuidae) дубово-лиственничных лесов Приамурья. - Тр. Зоол. ин-та АН СССР, 1967, т. 41, с. 73-79.

Сухарева И.Л. К фауне совок (Lepidoptera, Noctuidae) долины Кызыл-Кум. - Тр. Всесоюз. энтомол. о-ва, АН СССР, 1972, т. 55, с. 55-65.

Тахтаджян А.Л. Происхождение и расселение цветковых растений. Л.: Наука, 1970. 145 с.

Чернов Ю.И. Жизнь тундры. М.: Мысль, 1980. 235 с.

Kerppola S. *Autographa mandarina* (Lepidoptera, Noctuidae), a new moth for northern Europa. - Not. Entom., 1979, vol. 59, p. 47-49.

Koponen S., Laasonen E.M., Linnaluoto E.T. Lepidoptera of Inari Lapland, Finland. - Kevo notes, 1982, teos 6, S. 1-36.

А.В. Баркалов, А.К. Багачанова, 1985

К ФАУНЕ СИРФИД РОДА *CHELOSIA* MEIGEN, 1822
(DIPTERA, SYRPHIDAE) ЯКУТИИ

Материалом для настоящей публикации послужили сборы, проведенные в 1973-1981 гг. А.К. Багачановой и другими сотрудниками Института биологии Якутского филиала СО АН СССР, и коллекции Зоологического института АН СССР (Ленинград).

Район исследования охватывал следующие пункты: окрестности д. Хаптагай, 35 км к юго-востоку от Якутска, правый берег Лены; д. Октемцы, 50 км к юго-юго-западу от Якутска, левый берег Лены; д. Мегино-Алдан, 20 км от устья Амги, левый берег Алдана; с. Якобит, 47 км от Алдана, р. Кайла; поселки Усть-Мая и Хандыга, среднее течение р. Алдан; пос. Томмот (высота плато 400 м над ур. м.); гора Чульман (высота 700 м) и пос. Нагорный (высота 1000 м); с. Токко, 60 км юго-западнее Олекминска, р. Чара; устье рек Молбо и Токко (притоки р. Олекмы); с. Томтор; пос. Белая Гора, среднее течение р. Ингидирки; пос. Походск и Черский, низовья Колымы. В общей сложности сборы проведены в 30 пунктах, отмеченных на карте (рис. 1).

При описании распространения сирфид мы придерживались деления Якутии на районы, предложенные А.Н. Кириченко и Н.Н. Винокуровым /1975/: Юго-Западный (Ю.-З.), таежный со степными участками; Южный (Ю), горно-таежный; Центральный (Ц), таежный со степными участками; Восточный (В), горно-таежный, в нем выделяются два подрайона со степными участками - Янский (ВЯ) и Индигирский (ВИ).

Фамилии сборщиков даны сокращено: А.И. Аверенский - А., Ю.Н. Аммосов - Ам., Л.В. Бианки - Б., Н.Н. Винокуров - В., В.Н. Ефремов - Е., А.И. Иванов - И., Е.Л. Каймук - К., Т.Н. Максимова - М., Э.П. Нарчук - Н., Н.К. Потапова - П., В.И. Сычев-