

DIPTERA

SVECIAE.

Descripta

a

CAROLO FREDERICO FALLÉN,

Historiæ Natur. Profess.

Reg. et Ord. in Academia Lundensi,

Reg. Acad. Scient. Holm. Membro.

(2 vols.)

VOLUM. I.

DIPTERA SVECICANUM, INSTRUCTORUM, PARTICULATIS

instructorum

SECTIONEM PRIOREM

continens.

LUNDE A. 1814 — 1817, Litteris BERLINGIANIS.

S Y R P H I C I.

Os clypeo corneo, subconico, non mystaceo; proboscide palpisque simplicibus.

Antennae triarticulatae: articulo extimo lamelliformi, dorso saepissime setigero.

Alae areis discoidalibus plerumque binis prope a margine interiori collocatis, area angulari nervoque furcato in medio alae inchoato (nervo autem interiori marginali nullo) instructæ.

Corpus saepe magnum vel oblongum vel ovatum, magis minusve pubescens. **C**lypeus corneus, saepe perpendicularis, haustellum, proboscidem palposque binos involvens; extus dorso plerumque gibbus et tuberculatus, nunquam mystaceus, frontem constituens. Capitulum proboscidis saepius parvum: stipite longa. **P**alpi filiformes. **A**ntennæ suprà medium frontis insertæ, triarticulatae: articulis infimis saepissime brevibus, subpilosis; ultimo compresso, vel oblongo vel rotundato, nudo, infimis semper latiori. **S**eta dorsalis vel simplex, vel plumata, in **C**ERIA nulla. **O**culi maximi, ovati s. oblongi, vel nudi vel hirsuti. Segmentum abdominis baseos minutum, ab Auctoribus vix commemoratum, in hoc opusculo p rimum adpellatur. **P**edes validi: femoribus saepe incrassatis et muticis, raro spinosis; tibiis autem semper subincurvis, tomentosis, inermibus. **T**arsi 5-articulati, raro dilatati, at unguibus pulvillisque semper terminati. — **D**irectio nervorum in alis (et numerus) si generaliorem spectes, per totam Syrphicorum familiam, sat similis est. Si autem specialiorem quaeris, i. e. inflectionem nervorum longitudinalem, in nervos transversos juxta marginem alae interiorem desinentium, eam sat variabilem invenies, neque eam sequioris strukturam semper videlis. Consideratio haec specialior ad determina-

nationem Generum non semper valet, sed pro sectionibus specie-
rum formandis, ut et pro ipsis speciebus maxime affinibus a se in-
vicem distinguendis haud parvi est momenti. Sic nervus co-
stalis desinit vel paullo ante vel in ipso apice alae, rarius pone
apicem. Nervus secundarius desinit paullo pone medium
costae; at nervus auxiliaris longissimus totam costam fere
sequitur et in hac familia nervum constituit longitudinem
secundum. Ex anastomosi nervorum haud procul a basi alae
sita, (e nervulis aliquot transversis composita) exit nervus longi-
tudinalis (nervus furcatus) nervo auxiliari proximus, qui
fere in medio alae abit in furcam, h. e. in duos nervos longitudinales,
quorum alter, qui nervus tertius appellatur, cum ner-
vo auxiliari combinatur; alter, qui quartus vocatur, (interdum
valde incurvatus) cum nervo costali conjungitur. — Ex anastomosi
nuper commemorata exit quoque nervus longitudinalis spurius,
et juxta hunc nervus quintus longitudinalis, qui haud procul a
marginre interiori ita flectitur, ut cum nervulo transverso pone
medium disci sifo et cum nervo quarto longitudinali formet arcu-
tam discoideaem, quatenus cum ipso nervo costali in uno eodemque
puncto non plane combinetur. Huic areae discoidali contigua est
altera, quae area specularis appellatur (in medio fere disci,
s. propius ad marginem interiorem sita) antice in nervo
transverso ordinario inchoata. Haec autem area specularis
saepē terminatur nervo juxta marginem interiore magis
minusve recto, eandem scilicet directionem cum apice areae ad-
jacentis interdum habente, interdum non ita. Praeterea duo ad-
sunt nervi longitudinales, qui aream constituant angularem.
— Nervis inter se ita comparatis facile observantur tres areae
longitudinales, in basi alae inchoatae (quarum extima s. angularis praecipuum praebet notam,) et duae areae discoideaes, in hac Dipterorum Familia, propius ad marginem alae
interiore retractae. — Nervus alarum quartus longitudinalis, per totam Syrphi sectionem secundam et in Scaeva alneti,
versus medium areae discoidalis distincte inflectitur; in reliquis
speciebus non ita.

Omnes hujus familiae species, seta antennarum plumata in-
structae, vel in Syrpho vel in Rhingia exstant.

Mares a feminis facile distinguuntur: genitalibus exsertis,
corneis, uncinatis, sub ano dextrorum inflexis. Vagina autem fe-
minae brevis, vix erumpens, abscondita. Anus igitur in Mare sem-
per obtusus, subtus incrassatus; in femina autem magis acutus,
aequa-

acqualis, depresso. Praeterea Oculi in vertice Maris saepius arce cohaerentes, in femina dissepimento verticali disjuncti. In singulo tamen genere plerumque dantur species, quarum oculi in vertice utriusque sexus sat late distant.

Larvae in locis humidis potissimum habitant, radices plantarum et vegetabilia putrida verisimiliter devorantes. Plures Scaevae Specierum larvas aphidivoras, singulari corporis structura praeditas, observavimus ipsi. E corporibus Animalium putridis vix unquam nutrimentum petunt Larvae. Ipsam quoque Eristalem coemeteriorum cadavera nequaquam devorasse verisimiliuum putamus.

Imagines flores sedulo visitant; in primis in arbustis, et in pratis silvaticis, uliginosis, susurro pipiente, velocissime saepe volitant; interdum in aere quasi pendentes, totam silvam, aestate serena, sono sibilante implent.

Huic Familiae verisimiliter associari debet MERODON Fab. "palpis nudis subclavatis". Species autem M. femoratus et spodacricus, Fabr. Syst. Antl., in Svecia obviae, ad nostram Milesiam pertinent.

Species Syrphicorum circiter 30, in Genere MUSCA Faun. Svec. Edit. 2 commenmorat Ill. à LINNÉ. Nostro autem tempore species hujus Familiae, saltim 100 detectae, ad utrumque sexum facile extricabiles, numerantur.

Microdon Os clypeo dilatato, convexo, æquali, parum descendente. Antennæ capite longiores, setigeræ: articulo basali longissimo.

Corpus inaequaliter pubescens, obtuse ovatum: abdomine incurvo, ventre concavo. Clypeus non tuberculatus, tomentosus: apertura oris parum retusa. Antennæ porrectae, elongatae, sublineares: articulo secundo brevi tertioque parum compressis, clavam tenuiorem referentibus. Seta simplex. Oculi nudati, oblongi. Areæ alarum discoidales binae terminantur propæ marginem interiorem nervis valde incurvis. — Vixtus haud rite cognitus.

1. M. mutabilis æneo-nigricans abdomen obscurum
tomento aureo mutabili, nervis alarum infuscatis.

Microdon Meig. Dipt. teste Cel. D. Fabr. *Mulio* Fabr.
Antl. 184. 4. *Syrphus* Ent. syst. 4. 294. 59. *Musca* Linn.
Fn. 1807. *Musca apiformis* De Geer Ins. 6. 128. 18. t. 7 f. 18
♂ verus.

Mas et Fem. Habitat in Provincia Calmariensi rarer. D. Zetterstedt. Corpus crassum, obtusum, Rhingia rostrata majus. Clypeus aenescens, latior quam in speciebus Mulionis, non exser-tus nec tuberculatus, tomento griseo-aureo sat dense vestitus. Oculi in utroque sexu interstitio verticali late disjuncti. Thorax nitidus obscure aenescens l. caerulecens, immaculatus, pubescens: pube tamen saepe detrita. Abdomen incurvum, obscurum, griseo l. aureo-tomentosum, villis densioribus maculas obliquas formantibus obsitum. Pedes inernes, tomentosi, nigri: tibiis basi angustatis albisque. Alae nigro-nervosae, in mare abdome breviores.

Var. β tibiis albis nigro-subannulatis; tarsis albis.

Var. γ tibiis tarsisque luteis; scutello ferrugineo.

Obs. Statura corporis paullo obtusior, structura clypei ut et articulatio antennarum diversa hanc speciem a Mulionibus imprimitis distinguunt.

Mulio Os clypeo gibbo parum descendente, ad emarginaturam unituberculato. Antennæ capite longiores, porrectæ, setigeræ: articulo basali secundoque subæqualibus.

Corpus oblongo-ovatum, tenuiter pubescens: abdome fornicate, fasciatim picto. Antennæ extuberantiae frontali insertæ: articulo ultimo elongato, compresso, parum dilatato. Seta simplex. Clypeus nudus apice emarginatus, tuberculo ante aperturam distincte armatus. Oculi maximi, in vertice maris contigui; vel nudi vel hirti. Arcae alarum discoidales binae proprie marginem interiorem terminantur nervis subrectis.

1. *M. fasciolatus niger*, thoracis maculis lateralibus lineola scutelli antica abdominisque cingulis sex flavis: quatuor interruptis.

Musca fasciolata De Geer Ins. 6. 124. 14 1. 7. f. 14
♂ Mulio arcuatus Pauz. Fn. 2. f. 10 ♀

Mas et Fem. Passim rarer obvius, sequentibus major. Clypeus flavus, linea media nigra. Oculi subhirti. Corpus nitidum nigrum. hirsutulum. Thoracis rudimentum 2 linearum dorsalium, maculae 2 laterales, maculae ante alas et lineola baseos scutelli flava. Abdominis segmentum 2. 3. 4. 5 in medio flavo-fasciata; praeterea segmentum 3. 4 terminantur linea apicis flava, unde sex extant cingula praeter maculam ani trigonam. Venter niger: incisuris flavis. Pedes flavi, inermes, parum pubescentes. Alae in margine exteriori brunnescentes: vitta obscuriori.

Var. β Scutello tuto subflavo, (junior)

2. *M. arcuatus niger* thoracis maculis lateralibus, abdominisque cingulis quatuor interruptis deorsim arcuatis flavissimis; scutello flavo: macula media nigra.

Fabr. Antl. 184. 5. Syrphus Ent. syst. 4. 293, 55 Musca Linn. Fn. 1806 De Geer ins. 6. 125. 15.

Mas et Fem. In floribus Umbellatarum mense Julio in Scania frequens. Clypeus flavus: linea media nigra. Oculi subhirti. Vertex in femina niger punctis, supra antennas 2 albis notatur. Antennae elongatae, nigrae. Thorax niger subnudus, antice in medio vittis 2 albis obsoletis et in lateribus maculis flavis notatus. Abdomen lateribus antice hirsutum; nigrum subnitidum: segmento 2. 3. 4. 5 flavo-cingulatis, arcubus deorsim flexis, in medio interruptis. Venter niger, basi et fasciis 2 interruptis flavis. Pedes flavi, inermes. Alae basi et costa lutescentes: nubecula pone medium fusciori, raro obsoleta.

Var. β ♀ segmento 2 et 3 apice anoque flavis. In hac varietate, quae rarissime occurrit, picturam abdominis videbis eandem et similem fere atque in *M. fasciolato*; picturam autem scutelli ventris diversam.

Obs.

Obs. Citata De Geerii et Panzeri, quae ad nostrum M. arcuatum attulit D. Fabr. ad Mulion. fasciolatum referri debent — Musca arcuata Panz. Fn. 60. t. 13 ad Syrphicos pertinet, sed aia et a Mulione arcuato longe diversa species, pluries minor. — Musca festiva Linn. Fn. 1812, quae respectu coloris et picturæ cum Mul. arcuato facilissime confundi potest, synonymi loco a Nob. D. De Geer p. 118. 9 ad Muscam citro-fasciatam citata, in Genere Scaeveya locum obtinebit.

5. *M. bicinctus* niger thoracis maculis lateralibus, scutelli apice abdominalisque cingulis duobus remotis subintegris flavis

Fabr. Antl. 183. 2. Suppl. 557. 1. Syrphus Ent. syst. 4. 293.
44. *Musca* Linn. Fn. 1805. De Geer ins 6. 126. 1. t. 7. f. 6 Panz.
Fn. 4 t. 18. ♀

Mas et Fem. Hospitatur cum praecedente minus frequens. Clypeus flavus, dorso longitudinaliter niger. Antennæ nigrae. Oculi subhirti. Thorax aeneo-niger, lineis 2 disci obsoletis albis maculisque laterum oblongis flavis pictus. Scutellum nigrum, summo apice flavum. Abdomen subnudum nigrum; segmento 2 et 4 arcuatim late flavo-fasciatis; segmento autem 3 et 5 arcu flavo tenuiori et parum manifesto notatis. Venter niger flavo-fasciatus. Pedes flavi, basi nigri. Alarum costa infuscata: macula oblonga fusciiori.

Var. β. cingulo segmenti tertii minori.

Obs. *Mulio devius* Fabr. Antl. 184. 4, nobis ignotus, cum *Musca devia* Linn. Fn. (Sarg. Xantopter. Fabr.) non confundi debet.

Ceria Os clypeo nudo, coarctato, descendente. Antennæ porrectæ, clavato-acuminatæ, petiolo communi insidentes, seta dorsali nulla.

1. *C. clavicornis* atra flavo-variegata ab domine subcylindrico: segmentis tribus apice flavis; alis costa late brunneis.

Fabr. Antl. 173. 1. Suppl. 557. 1. Meig. Dipt. 283. 1. 14
11. 12. ♂ ♀

Mu-

7

Musca conopsoides Linn. Fn. 1790. Panz. Fn. 44. t. 20 ♂

Mas et Fem. Habitat in Svecia rario, in horto praedii Beckaskog Scaniae die XIII Julii. 1810, in quercu succum extilante vivam cepimus. In Provinc. Calmar. D. Zetterstedt. Magnitudo et facies primae nostrae Milesiae speciei. Caput nigrum: fronte utrinque flava; punctis verticis feminae quattuor, et linea sincipitis interrupta flavis. Oculi nudi, oblongi, in mare conjuncti, in femina distantes. Clypeus perpendicularis corneus, nudus; infra oculos descendens magisque coarctatus; supra aperturam oris tuberculo distinctiori instruitur; apice emarginatus, retusus. Capitulum proboscidis haud ita magnum. Antennae nigrae, elongatae, porrectae, petiolo solido subcylindrico insidentes: articulo primo cylindrico, secundo ultimoque clavatis, subcompressis. Terminatur articulus ultimus apice acutiori, subarticulato albo. Seta igitur dorsalis nulla. Ipse petiolus, antennis parum brevior, basi ferrugineus. Thorax niger punctulatus, nudus, tuberculo utrinque humerali et juxta scutellum linea elevatiori instruitur. Scutellum nigrum, impresso-punctatum, breve: linea antica flava. Abdomen thorace paullo angustius, subcylindricum, punctulatum, nudum, nigrum; segmento primo antice late emarginato, bilobato: lobis flavis; segmento 2. 3. 4 apice flavis. Segmenta ventralia apice alba. Pectus nigrum: puncto et lineola laterali, ante alas flavis. Pedes nigri, femorum tibiarumque basi late flava. Femora postica paullo incurvata, subtus dense, at brevissime spinosa. Plantae luteo-sericeae. Alae a basi usque ad apicem costae bruneo-nigricantes, striga fusca a basi ad medium disci nervum sextum longitudinalem cingente. Squama brevis. Halteres flavissimi.

Obs. Nullum est dubium, quin ad Syrphicos rite referatur haec species, licet nulla adest seta dorsalis antennarum. Os enim proboscide instruitur, ideoque ad Coniopsarios non mandari potest nec debet. Insertio plane singularis antennarum propriam et distinctam indicat speciem, ab aliis facile discernibilem.

Milesia Os clypeo obtuso, in medio impressus. Antennae capite breviores subdeflexae: articulo ultimo dilatato, compresso 1 rotundato 1. oblongo: seta simplici. Corpus oblongum, abdominalis latitudine subaequali.

Clypeus perpendicularis non tuberculatus, infra antennas impressus; in prima specierum sectione, magis inaequalis et infra ocu-

oculos descendens; in speciebus secundæ sectionis, e quibus characterem generis fixit Col. FABRICIUS, infra oculos vix descendens, truncatus. Apertura oris ovata. Corpus subglabrum, non hispidum. Femora postica, praesertim in sectione secunda valde incrassata subtus denticulata. Directio nervorum eadem fere atque in Syrphis primæ sectionis. Nervus autem auxiliaris nervo costali valde approximatus.

* *Clypeus infra oculos descendens.*

- 1 M. Zetterstedtii nigra;** thoracis maculis, abdominis cingulis subquatuor tibiisque posterioribus flavis; alis longitudinaliter dimidiato-brunneis.

Habitat ad Lårketorp Ostrogothiae et in Smolandia mense Junio rarissime, D. Zetterstedt.

Mas et Fem. Magnitudo et facies Ceriae clavicornis, a structura antennarum alia corporisque pictura paullo diversa. Clypeus niger apice descendens et sursum flexus: linea utrinque laterali argenteo-micante, quae in femina ad verticem ascendit. Oculi, nudi in Mare conjuncti. Antennae breves, luteae, protuberantiae frontis insidentes. Thorax niger, subopacus: puncto utrinque humerali fascia que ante alas interrupta albis. Scutellum nigrum, immaculatum. Abdomen nigrum, magis nitidum, forniciatum, lineare, aureo s. flavo-cingulatum: cingulis in mare vix nisi tribus, in femina quatuor distinctis, integris, subarcuatis, ante medium segmentorum collocatis. Venter flavo-subcingulatus. Pedes nigri: genibus, tibiis, tarsisque posterioribus luteis. Alae ad costam longitudinaliter late saturateque brunneae.

- 2 M. diophthalm a nigra,** thoracis maculis abdominalisque cingulis sex flavis; pedibus luteis; femoribus posticis unidentatis.

Fabr. Antl. 187. 2. Syrphus Ent. Syst. 4 300. 79 Musca Linn: Fn. 1810. Panz. Fn. 72. f. 23 ♀

Mas et Fem. In Vestrogothia, D. Gyllenhal, in Provinc. Calmar. D. Zetterstedt. Longitudo Syrphi pellucentis, a: angustior, praecedente major, Vespam respecie picturæ mentiens. Frons flava: linea media nigra. Oculi nudi, aenei, margine omni et linea media nigri, in mare conniventes. Antennæ sat elongatae,

tae, luteae. Thorax niger maculis utrinque 2 humeralibus et 3 lateralibus ut et lineola arcuata in apice flavis. Scutellum nigrum, apice luteum. Abdomen tomentosum, nigrum: segmento 2. 3. 4. flavo-fasciatis. In singulo segmento duæ adsunt fasciae, altera in medio, altera in apice, quæ in lateribus non connatae sunt. Segmentum anale et pedes lutescunt, tibiarum basi magis flavicante. Femora postica ceteris crassiora, dente unico valido subtus pone medium armata. Alae luteo-nervosae, ad costam dimidiato-brunnecentes.

5 *M. vespiformis nigra*, thoracis maculis abdominalisque cingulis utrinque connatis flavo-albis; pedibus luteis: femoribus muticis.

Fabr. Ántl. 188. 3 *Syrphus Ent. syst. 4.* 300. SI. ♀ Panz. Fn. 90. f. 19 ♀ cingulis albis. (*Musca Linn. Fn. 1811?*) De Geer Ins. 6. 122. 13. t. 7. f. 13 ♂

Mas et Fem. Habitat cum praecedente D. Zetterstedt. Facies et magnitudo praecedentis. Oculi nudi in mare cohaerentes. Clypeus niger, lateribus albo s flavo-micans, interdum totus flavescens. Antennæ luteae. Thorax niger subliirtus: macula utrinque unica humerali, fascia media e maculis 6 interruptis maculisque 3 supra scutellum flavis; ex his macula media, scutello proxima, trigona est et integra, non arcuata. Abdomen nigrum, tomentosum, non nitidum. Segmentum 2. 3. 4 (et praeterea in femina 5.) fasciis 2 flavo-albis in lateribus connatis instruta. Pedes lutei, antici nigri: genu luteo. Alae sublutescentes, brunneo-nervosae. Pictura corporis in mare flava, in femina saepius alba.

Var. β ♀ abdominalis cingulis 4 simplicibus; in copula cum mare var. a inventa: Margo segmentorum non flatus, sed niger.

Obs. Color clypei flatus s. albus e squamulis densis oritur, contactu facile delebilis. Haec species a Mil. diophthalma differt: femoribus posticis in utroque sexu muticis. Omnes praeterea maculae thoracis et fasciae abdominalis e squamulis densis constant. His squamulis vi sublatis, tollitur quoque pictura. Contra autem haec pictura in Mil. diophthalma ipsi corpori, non squamulis tribuenda et quasi innata, deleri non potest.

Syrphus apiformis Panz. Fn. 45 t. 19 an varietas Mil. vespisformis nuper exclusa ideoque uberiori pilositate praedita? — *Milesia conopsea* Fabr. ad Genus *Scaevam* rectius referri debet. — *Milesia fallax* Fabr. idem verisimiliter insectum atque *Eristalis semirufa* Fabr.

** *Clypeus subtruncatus, infra oculos vix descendens.*

4. *M. silvarum æneo-nigra; tibiis flavis; abdeminis apice aureo-tomentoso.*

Fabr. Antl. 191. 13. *Syrphus* Ent. syst. 4. 191. 48. *Musca* Linn. Fn. 1804.

Mas et Fem. In floribus Scaniae minus frequens. Oculi ferruginei, nudi, in mare conjuncti. Frons nigra, squamulis densis albis s. flavis micantibus vestita. Corpus oblongum, æneo-nigrum, nitidum, parum pubescens, pube interdum aureo-nitente. Segmentum secundum mæulis binis aureis opacis, vix tomentosissimum notatur; tertium maculis binis fulvo-villosis, quartum autem (in descriptione Linn. l. c. tertium) totum aureum, villosum. Femora nigra, vix pilosa; postica ceteris crassiora. Tibiae flavae, sericeae, intus apice nigrae. Tarsi apice nigri. Alæ im-maculatae.

5. *M. segnis æneo-nigra, abdomine rufo, apice nigro; basi tibiarum alba.*

Fabr. Antl. 191. 14. *Syrphus* Ent. syst. et Panz. Fn. 60. t. 3. ♀ variet. *Musca* Linn. Fn. 1823. De Geer Ins. 6. 121. 12.

Mas et Fem. Statura *M. silvarum*. Oculi nudi, in mare cohaerentes. Frons nigra, albo-micans. Antennæ flavae. Thorax æneo-niger: puncto utrinque humerali et in lateribus maculae pilis s. squamulis albis facile detritis. Abdomen subtus et supra ad basin apicemque, nigrum: segmento secundo tertioque rufis, in latere albo-pilosis. Segnentum quartum nigrum, punctum utrinque a pilis albis interdum gerit. Femora nigra, postica incrassata, subtus denticulata, in articulo coxae Maris spina longa armata. Tibiae albo-tomentosae, basi albae. Tarsi pedum inprimis anticum albi: articulo ultimo nigro. Alæ hyalinae, lineolæ pone medium costæ fusca, parum manifesta.

6. M. ignava æneo nigra, abdominis dorso macularum duobus paribus rufis; tibiarum tarsorumque basi alba.

Syrphus ignavus Panz. Fn. 60. t. 4. var. (Milesia nemorum Fabr. antl. 192. 17 ♂?)

Mas et Fem. Habitat in Scania minus frequens. Mil. segni valde affinis; ejus quoque varietatem credit D. Fabricius; at praeter colorem abdominis diversum nulla in articulo coxae pedum posticorum adest spina longa, nec nisi dens brevis observatur. Maculae abdominis quatuor, quarum primum par in segmento secundo quadratum, secundum autem in segmento tertio ad latera propius interdum extenditur. Segmentum ultimum maculam e pilis albis utrinque lateralem habet. Venter basi late rufus. Pedes nigri; tibiarum basi articolisque duobus tarsorum albis. Tarsi postici toti albi. Aiae parum infuscatae.

Var. β abdominis basi (in vivis) subtus rufa, supra nigra, segmentorum maculis lateralibus plerumque obsoletis, albo-pubescentibus.

Var. γ ♂ ♀ tarsis posticis totis nigris.

7. M. pigr a nigra, abdomine rufo: ano pedibusque nigris.

Fabr. Antl. 192. 16. Syrphus Ent. syst. 4. 295. 63 Panz. Fn. 60. t. 5 ♀

Mas et Fem. Habitat passim in Svecia. M. segni valde affinis, at colore pedum nigro mox dignota. Oculi maris conjuncti. Frons nigra, albo-micans. Thorax niger, antice utrinque pilis albis maculatus. Abdomen in utroque sexu ad basin et segmenta ultima nigra, at segmenta intermedia rufa. Pedes toti nigri: pube alba micante.

Var. β ♂ ♀ abdomine rufo: segmento basali genitaleque solum nigris; tibiarum anteriorum basi sordide pallida.

8. M. femorata æneo-nigra, subtomentosa; abdomine atro, femoribus posticis pedibusque anterioribus rufis.

Merodon femoratus Fabr. Antl. 197. 4. Syrphus Ent. syst. 4. 296. 65. Musca Linn. 1824 vera.

Mas et Fem. In Provincia Calmar. haud frequens. D. Zetterstedt. Oculi maris ante antennas rufas conniventes, feminae intersticio verticali late distantes. Frons nigra albo-micans, similiiter atque in speciebus nuper allatis constructa. Thorax aeneo-niger. Abdomen subpilosum, atro-caeruleum, immaculatum; aperturae laterales ferruginae (in vivis). Pedes rufi, nitidi, femorum posticorum apice tibiisque posticis nigris.

9. *M. pipiens nigra*, thoracis lateribus abdominisque maculis lateralibus albis; femoribus posticis nigris rufo-maculatis.

Fabr. Antl. 194. 2. *Syrphus* Ent. syst. 4. 310. 119. Panz. Fn. 32 t. 20 ♀ *Musca* Linn. Fn. 1822. De Geer Ins. 6. 120. 11. t. 7 f. 8.

Mas et Fem. In hortis mense Majo et seqq. frequens, tardus volitans; sonum pipiente edit, intra digitos deprehensa. Oculi aenei, nudi, in utroque sexu distantes. Clypeus in medio subcarinatus, albo-micans. Antennae basi rufescentes. Thorax aeneo-niger, lateribus et pectore albo-micans. Abdomen aequati latitudine nigrum, maculis utrinque albo nitentibus. Venter pallidus apice niger. Pedes anteriores fere albi s. lutei, postici autem nigri: annulo tibiarum luteo, femoribusque in utroque sexu valde incrassatis: puncto laterali luteo; subtus denticulatis. Alae immaculatae; squama alba, ciliata.

"Larva apoda tentaculata, brunnnea, caput versus crassior, in stercore equino versatur. In eunte mense Majo in pupam ovalem apice acuminatam transformatur. In medio ejusdem mensis exit imago". De Geer l. c. p. 121.

10. *M. clunipes nigricans* clypeo albo; abdome clavato flavo fasciato; alis hyalinis: nervo quarto aream discoidalem terminante arcuatim flexo.

Habitat in Smolandia superiori D. Bogeman.

Mas et Fem. Statura parva Milesiae podagrcae, eique sat similis, at species certe diversa. Corpus elongatum, tenue pubescens, nigrum nitidum: abdome in utroque sexu ad apicem clavato s. dilatato, ad basin coarctato, segmentis scilicet basalibus elongatis tenuibus, nigris. Segmentum tertium in mare antice late flavum; in femina autem segmenta ultima, quae clavam formant, maxima

ex parte flava sunt, fascia apicis segmentorum nigra. Clypeus albus paullo descendens, apice antrorum elevatus. Oculi magni, rotundati, in utroque sexu paullo distantes. Pedes pallidi; postici, crassi: femoribus tibiarumque apice late nigris. Alae immaculatae, abdomine paullo longiores. Squama parva, alba. — Apertū differt a Mil. podagrīca: colore clypei alarumque. Nervi transversi minime infuscati, nec ita directi. Etenim in M. podagrīca terminantur arecae discoidales nervis subrectis, at in M. elunipede arcuatim omnino flectit apex nervi quarti longitudinalis. Antennae praeterea in hac rotundatae, in illa magis evatae.

M. podagrīca æneo-nigra, abdomine subclavato bifasciato; alarum nervis transversis infuscatis.

Merodon podagricus Fabr. Antl. 198. 10. Syrphus Ent. Syst. 4. 299. 77. Panz. Fn. 59 t. 16. ♀

Mas et Fém. In hortis valde frequens, tarde volitans, Minuta et angustata. Oculi nudi, in utroque sexu distantes. Interstitium verticis et frons æneo-atra. Clypeus descendens, impressus muticus. Corpus nudum, æneo-nigrum, abdomine basi coarctato, segmentis duobus maris intermediis luteo-fasciatis, in femina luteo-maculatis. Pedes anteriores plerumque albidi; postici nigri: femoribus incrassatis, subtus spinulosis, basi tarsisque albis. Basis quoque tibiarum saepe alba. Venter pallidus, in mare ad apicem niger. Alarum nervi transversi infuscatae, unde alae maculatae conspicuntur.

Not. Structuram antennarum "articulo tertio dorso canaliculato: seta articulata" in M. femorata et M. podagrīca, quas generi Merodonti inseruit D. Fabricius, frustra quaesivimus. Habitus autem et structura oris harum specierum cum ceteris Milesiis secundae sectionis omnino convenient.

Reliquae species, quae habitu corporis ad Milesias sat prope accedunt, femoribus scilicet posticis incrassatis, interdum quoque spinulosis instructae, secundum diversam clypei structuram in Syrpho, Eristale et Pipiza quaeri debent.

BACCHA *Clypeus tuberculatus, non descendens: apertura oris prominula. Antennae breves deflexæ: articulo ultimo rotundato. Corpus elongatum, angu-*

gustatum: capite maximo, oculleo, abdomine basi coarctato.

1. B. elongata thorace æneo, abdomine nigro: segmento secundo tertioque basi flavis.

Fabr Antl. 200. 6. *Syrphus* Ent. syst. 4. 299. 76.

Mas et Fem. In gramine pratorum Scaniae mense Junio haud frequens, tarde volans. Longitudo Milesiae segnis, at corpus fere filiforme, aeneo-nigrum, antice nudum. Oculi maximi, nudi, ferruginei, in mare arcte cohaerentes. Frons aeneo-nigra, sub antennis bituberculata. Abdomen pilosum, longissimum, valde angustum, postice inprimis in femina clavatum: fasciis 2 flavis. Pedes flavi, tenues, simplices; articulus tamen primus tarorum posticorum reliquis paullo crassior. Alae abdomine breviores, in mare subnigricantes: nervis transversis infuscatis; in femina fere hyalinae. Directio nervorum et structura genitalium clypeique, hujus omnino fauniae sunt.

Obs. *Baccha sphægea* Fabr. et Panz. Fr. 77. t. 21. ab hac familia penitus removeri debet, nimirum juxta *Loxoceram* in familia *Ortalidum* collocanda.

C E P H A L O P S Os clypeo exiguo, rima linearis caput in duas hemisphæras secante, proboscidem includente.

Antennæ breves: seta dorsali erecta simplici. Corpus cylindricum: capite maximo, oculeo; alis abdomine longioribus; area discoidali unica s nulla.

Hoc Genus *Bacchæ* valde affine; variis tamen notis distinctum.

Corpus minutum, inerme. Caput magnum, totum oculum: dissepsimento verticali tenuissimo, linearis, (in mariibus nullo) per aperturam oris transeunte et caput in duas hemisphaeras secante. Clypeus igitur vix discernibilis. Antennæ brevissimæ, apice magis minusve acuminatae: seta dorsali erecta. Abdomen subcylindricum inflexum: ano in utroque sexu obtusissimo, genitale in Mare dextrorsum flexo, in femina vagina inflexa. Alae abdomine longiores: area discoidali inter nervum 4-5 longitudinem unica, quae nervulo transverso ordinario recto non procul a margine alae terminatur. At area inter nervum 3-4 usque ad apicem alae (haud aliter atque in *Myopis*) de-

scen-

scendit (ideoque ei nomen areae discoidalis minus aptum videtur) et cum nervo costali conjungitur. In C. spurio ejusmodi areae discoidales non adsunt. Pedes simpliciores quam in Milesiis.
— Motus: reptatus in foliis et volatus brevis.

1. C. pratorum ater, pedibus discoloribus; nervo alarum quarto longitudinali angulum ad nervum transversum ordinarium formante.

C. aeneus olim in Diss. nov. Dipt. method. pag. 25.

MAS et FEM. In hortis Scaniae rarer, at in gramine pratorum Esperöd mense Augusto frequentissimum. Musca putri Linn. non major, saepius minor; alis tamen amplioribus. Oculi obscure ferruginei, nudi, in summo maris vertice cohaerentes, intersticio frontali tenui, linearci, nigro albo-nicante. Corpus atrum vel nitens vel opacum; puncto utrinque humerali calloso interdum pallido; regio sub scutello, abdominis basis ut et latera thoracis (oculo arinato) griseo-micantia. Abdomen lineare, thorace angustius, vel totum nigrum, vel griseo-micans, brunneo intermixtum; segmentorum apice in primis griseescente. Pedes nudi vel toti flavi (in individuis aliquot majoribus) vel nigri; genubus tarsisque, interdum tibiis totis, flavis. Alae ab domine duplo longiores, pulchre aeneo-nitentes; vitta costali fusciori, plerumque obsoleta. Directio nervorum ut in descriptione generis et in diagnosi jam commemorata.

2. C. opacus nigricans, nervo alarum quarto longitudinali angulum non formante.

Habitat in Ostrogothia. D. Zetterstedt.

MAS Praecedente vix minor. Corpus obscurum, non aeneonitens: ab domine aterrime opaco. Pedes nigri: tibiis tarsisque anticis albis? Nervorum in alis directio ut in praecedente; at nervus quartus juxta nervum transversum ordinarium haud ita inflectitur, nullum formans angulum.

FEM.

Obs Individuum unicum vidimus, forsitan ad C. pratorum referendum, in directione nervorum modo aliquatenus aberrans.

5. - C. spurius opaco-nigerrimus, pedibus nigris; alarum area discoidali nulla

Mas et FEM. Hujus certe generis, in foliis Carpini Betul. Esperid mense Augusto rarer reptans; pulice paullo major. Structura capitis praecedentiam. Corpus opacum, nigrum: abdome lineari. Pedes immaculati. Alae subnigricantes, aeneo-nitentes, nervis tenuibus. Deest nervus ante margine in interiorum transversus, (qui in praecedentibus aream discoidalem terminat), eodem modo atque in Oscinibus; at area angularis certissime adest, quamvis nervus alter, angulum formans, tenuior et obsoletior.

Var. β . Abdomine pedibusque subpallidis; nuper exclusa.

Syrphus Os clypeo perpendiculariter prominente, I. gibbo l. leviter tuberculato, apice coarctato, descendente. Antennae breves: articulo ultimo compresso, dilatato & ovato l. rotundato, setiger. Corpus hirsutum: abdome fornicato.

Corpus magnum, oblongo ovatum, magis hirsutum; quam in plerisque reliquis Syrphicorum speciebus. Antennae deflexae: seta dorsali vel plumata, vel nuda. Thorax saepissime niger: hirsutie tamen varie colorata. Pedes validi: tibiis posticis sat distincte incurvis. Alarum nervi, qui areas binas discoidales prope a margine inferiori terminant, saepius recti sunt, in unica quasi linea directi; at nervus quartus magis minusve incurvatur et paullo ante apicem alae cum nervo costali conjungitur; ita tamen, ut ipsa area, ad quam pertinet, ante conjunctionem desinat. Squama saepe brevis.

* Nervi longitudinales omnes fere recti

α) Seta antennarum plumata

(Clypeus in conum longe descendens.)

1. S. bombiformis niger, hirtus; thoracis antico scutellique apice flavo-hirsutis; fascia segmenti secundi & ano albo-hirsutis.

Diss.

Diss. Nova Dipt. Meth. pag. 25.

Mas et Fem. colore similes. Inter nostrates maximus, Bom
bum hertorum Fabr. respectu hirsutiei colorisque mentiens. Ha-
bitat in silva Esperöd Scaniae, mense Julio et Augusto, rarissime
obvius. — Antennarum articulus ultimus rotundatus, compres-
sus; seta distincte plumata. Clypeus niger, dense griseo-tomen-
tosus, in medio denudatus. Oculi nudi, in mare connexi. Tho-
rax hirtus: hirsutie antica scutellique flava. Pectus nigrum, pi-
losum. Abdomen hirtum: hirsutie segmenti secundi anique gri-
seo-alba, parum densa. Venter concavus, nigricans. Femora pi-
losa, valida; postica magis ir. crassata, longiora, incurva. Tibiae
tarsique dense pallido-sericea. Tibiae posticæ incurvae. Alae
hyalinæ: fascia media fusca, brevi obsoleta.

Obs. A Syrpho equestri Panz. vere diversa species, licet
habitu ei sat similis videatur.

Fascia s. nubecula alarum, quae in plurimis hujus Generis
speciebus adest, nervulos medios transversos ambit.

2. S. plumatus niger, hirsutus: hirsutie thoracis lu-
tescente, ani albicante; macula alarum media ni-
gricante.

Musca plumata De Geer Ins. 6. 154. 2. t. 8. f. 4. ♀
Syrphus mystaceus Fábr. Antl. 224. 5. Ent. syst. 4. 279. 5. Mu-
sca mystacea Linn. Fn. 1793 var. β? Panz. Fn. 8. t. 22. ♀+

Mas et Fem. In pratis primo vere flores sedulo visitans.
Femina ova circiter 70 parit alba. — Oculi subhirsuti l. nudi,
in mare conniventes. Clypeus flavus, conicus, apice lateribusque
niger. Antennae flavae, basi nigrae: articulo ultimo elongato,
pluma nigra. Interstitium verticale feminae flavum. Thorax ni-
ger, lanugine flava vel dense tectus, vel in disco denudatus s. nü-
gro-hirtus. Scutellum luteum, dense flavo-hirtum. Abdomen ni-
grum, hirsutum, antice macula utrinque et ano griseo-flavo-hir-
tum; at denudatum duas ostendit maculas laterales ferrugineaes
maculamque baseos utrinque pallidam. Venter niger. Pedes ni-
gri, pilosi, validi, femoribus omnibus rectis; tibiis posticis in-
curvis, singulis basi albis. Alae fusco-nervosae: macula media
nigricante.

Var. α thorace toto flavo-hirsuto, a D. De Geer l. c. descripta.

Var. β thoracis disco nigro-hirsuto, pedibus totis nigris. In Scania frequentior.

Obs. Hirsuties oculorum, hac in specie semper forsitan nativa, aut vi illata aut aetate in quibusdam individuis deteritur.

Musca mystacea var. α Linn. Fn. 1793 a D. DE GEER Ins. 6. 133. l. t. 8. f. 2. ♀ descripta et delineata, et a D. FAERICIO ad *Syrphum mystaceum* citata, minimè pertinet ad nostram speciem sed ad *Musca* in, quae nomen *M. mystacea* am in collectione nostra habet. Hujus enim structura oris nervorumque in aliis directio eadem omnino et similis atque in *Musca meridiana* Linn. cui praeterea setae mystacinæ competitunt. Ejusmodi autem setae in *Syphicis* non dantur, neque in Charactere generis *Syphii*, quem a *S. mystacea* desumisit FAERICIUS, mystacum ulla sit mentio.

3. *S. bombylans* niger hirsutus, abdominis apice luteo-hirto; alarum macula media nigra.

Fabr. Antl. 224. 4. Ent. syst. 4. 279. 4. (Panz. Fn. 8. t. 21. ♀; deest macula alarum) *Musca* Linn. Fn. 1792.

MAS et FEM. Passim in floribus. Oculi in mare conniventes, subhirti, in femina an semper nudi? Clypens, antennae et alae ut in *S. plumato*, cui valde similis; at thorax totus nigro-hirsutus, et abdomen apice modo rufè, modo fulvo-hirtum. Pedes nigri, pilosi: femoribus validis, tibiis basi et tarsis (saepius) ferrugineis. Tibiae posticae distincte incurvae.

4. *S. mussitans* æneo-nigricans, thorace abdominisque dorso toto fulvo hirsutis; alarum macula fusca.

Fabr. Antl. 225. 6. Ent. syst. 4. 279. 6. (Panz. Fn. 1. t. 15. pictura manca).

MAS et FEM. In Scania rario. Statura et magnitudo præcedentium. Oculi nudi, in mare cohaerentes. Clypeus flavus, apice lateribusque niger. Antennae flavae: articulo ultimo rotun-

tundato, brevi. Corpus nigricans, totum supra dense fulvo-hirsutum, in primis in thorace et in scutello. Venter in vivis virescens. Pectus et pedes pilosa, nigra: femoribus posticis elongatis, incrassatis, incurvis. Alae basi pallescentes: fascia pone medium brevi nigra.

5. *S. pellucens niger*, abdominis antico albo-pellucido; alaruin macula nigricante.

Fabr. Antl. 224. 3. Ent. syst. 4. 379. 3. Panz. Fn. 1. t. 17. Musca Linn. Fn. 1826. De Geer Ins. 6. 53. 1. i. 3. f. 1. ♀.

MAS et FEM. In Vermelandia et in Scania frequens. Inter Diptera maxima. Oculi nudi, in mare cohaerentes. Articulus ultimus antennarum elongatus, flavus. Clypeus corneus, totus flavus, in medio gibbosus, crassus, breviter nigro-pilosus; intestinum verticale in femina flavum. Thorax niger, parum pilosus: lateribus ut et scutello inani flavis, in exsiccato interdum nigris; setis rigidis nigris armatus. Abdomen parum pubescens: segmento primo brevi nigro; secundo lato albo-pellucido; reliquis nigris: ventre concolore. Alae basi flavescentes, dein fusco-nervosae: macula media magna nigricante.

6. *S. inanis niger*, scutello abdominalisque fasciis flavo-pellucidis: prima interrupta; alis submaculatis.

Fabr. Antl. 223. 1. Ent. syst. 4. 278. 1. ♂ *S. micans* Fabr. Antl. 224. 2. ♀? *S. bifasciatus* Panz. Fn. 2. t. 6 ♀ Musca inanis Linn. Fn. 1825 vera. M. apivora De Geer Ins. 6. 56. 3. t. 3. f. 4. ♀.

MAS et FEM. In hortis Scaniae et in nemoribus Calmariae, minus frequens. *S. pellucente* parum minor. Oculi hirsuti in mare cohaerentes. Antennae luteae: articulo ultimo elongato. Clypeus corneus, breviter tomentosus, crassus, flavus, dorso gibbus: linea utrinque lateralij nigra. Thorax nigricans: lateribus flavicantibus, villosis, setosis. Scutellum inane flavum, nigro-setosum. Abdomen inane, pubescens, basi et ano nigrum: fasciis quatuor latis, flavis; prima interrupta. Apex vero segmen-

torum niger. Segmentum anale in mare mortuo vaginatum fasciam quartam abscondit; unde tres tantum fasciae conspicuntur. Venter flavus, ante anum nigro fasciatus. Femora recta, modo basi, modo tota nigra. Tibiae flavae; posticae saepe nigro-annulatae. Alae flavescentes: macula media et altera ante apicem fusca, obsoleta.

Obs. Specimina recenter capta serico paullo micant.

7. *S. borealis nigricans*, pubescens, scutello nigricante; abdomine interrupte flavo-fasciato; alis subimmaculatis: costa brunnescente; pedibus basi nigris.

Musca lappona De Geer Ins. 6. 141. 9. t. 8. f. 9. ♀?

Mas et Fem. In pratis Scaniae, Ostrogothiae flores visitans, quotanuis non semper frequens. Magnitudo praecedentis. Oculi nudi, in mare coniuentes. Clypeus corneus, crassus, flavus: linea media unituberculata lateribusque nigris. Antennae nigricantes: articulo ultimo brevi, rotundato. Thorax niger, lateribus flavo-pubescentes, antice fascia obsoleta e pube flavescente parum conspicua notatus. Desunt setae rigidae in thorace et in scutello. Abdomen margine inprimis pubescens l. 4-1 3-fasciatum: fasciis flavis, in medio attenuatis; prima semper interrupta. Ceterae vel integrae vel interruptae. Anus flavus. Pedes pubescentes, lutei; fomoribus basi nigris, posticis elongatis, incrassatis, incurvis. Alae vix s. parum infuscatae, margine tantum exteriori brunnescentes: nervis fuscedine non cinctis.

8. *S. lapporum nigricans*, pubescens scutello ferrugineo; abdomine interrupte albo-fasciato; costa alarum nervisque fuscedine cinctis; pedibus luteis.

Fabr. Antl. 226. 7. Ent. syst. 4. 280. 7. (*Musca lappona* Linn. Fn. 1794?)

Mas et Fem. In Svecia superiori frequens. In Scania longe rarer. Praecedenti ita similis, ut meram ejus varietatem crederes. Semper tamen paullo minor, et verisimiliter species diversa.

versa. Clypeus medio niger, lateribus albicans. Antennae et oculi ut in S. boreali. Thorax niger, lateribus magis pubescens: macula antica e villis albis congestis. Scutellum totum ferrugineum. Abdomen nigrum, opacum: fascia trium segmentorum alba, in medio interrupta. Pedes toti plerumque lutei: femoribus modo anticis basi extus saepe nigris. Alae extus brunnescentes: nervis maculaque ante apicem obscurioribus.

Obs. Differt igitur a S. boreali: alis magis coloratis, fasciis abdominis non luteis sed albis, angustioribus, ut et pedibus saltim posterioribus totis luteis. Scutellum praeterea in S. lapporum ferrugineum post mortem vix nigrescit.

Synonymon Linn. utrum ad hanc vel ad praecedentem rectius referri debeat, difficile est dictu.

β Seta antennarum nuda.

(Clypeus obtusus, inaequalis.)

g. S. oestraceus niger hirsutus; thoracis abdominisque fascia antica albo-pilosa; ano fulvo hirsuto.

Fabr. Ent. syst. 4. 290. 44. Eristalis Antl. 240. 34 (Syrphus rupestris Panz. Fn. 59. t. 15. Musca oestacea Linn. Fn. 1801. De Geer Ins. 6. 159. 4. vera.)

Mas et Fem. In umbellatis mense Julio, quotannis non aequo frequens. Esperöd. — Oculi hirsuti, in mare cohaerentes. Clypeus niger, albo-micans, parum descendens, supra aperturam oris striga impressa et tuberculo instructus. Articulus antennarum ultimus rotundatus, brevis, flavus. Thorax niger, nitidus: hirsutie antica et in scutello minime densa, albo-grisea; hirsutie autem intermedia nigra, fasciam constitente. Abdomen nigrum, nitidum, thorace non latius: hirsutie baseos tenui albo-grisea, segmenti tertii nigra, anique fulva. Venter niger. Pedes nigri, griseo-pilosí, simplices. Alae hyalinæ, nubecula media infuscatae.

Obs. Habitus, hirsuties corporis, nervorumque directio hujus speciei eadem fere atque in antecedentibus; at structura clypei eadem fere atque in sectione Syrphi secunda. — Figura Panz. I. e. male picta; at descriptio adaequata. — Cave ne hanc speciem cum Scasva syrphoide confundas.

10. *S. asilicus* thorace flavo-hirsutissimo; abdomine pubescente atro-cyaneo: basi fasciisque glauco-albis.

M^{as} et FEM. In Ostrogothia D. Zetterstedt; in Uplandia D. Haffner; in Scania, rarer. Longitudo S.-mussitantis, at angustior Antennae subflavae, porrectae, protuberantiae scilicet frontali insertae: articulo primo elongato, tereti; ultimo compresso, rotundato, obtusissimo, deflexo. Clypeus crassus, infra antennas impressus; dein gibbus, at vix tuberculatus, infra oculos longe descendens; aut totus albo-micans (in maribus plerumque) aut in medio denudatus, niger (in feminis saepius). Oculi nudi, in mare cohaerentes. Thorax et scutellum hirsutissima: hirsutie flavescente. Abdomen thoracis latitudine, depressiusculum, pubescenti rictiori tectum, atrum, nitidum: segmentis quatuor fascia tenuiori alba interrupta, fere in medio singuli segmenti sita. Praeterea adest interdum ad singulam fasciam linea utrinque cyanea. Segmentum basale inane, glaucum. Venter fornicatus, inflexus, albo-fasciatus. Femora nigra, pilosa: postica elongata, reliquis vix crassiora, recta. Tibiae albicantes, posticae vel nigrae vel basi albae. Tarsi albidi. Ungues nigri. Alae hyalinae, ad basin paullo flavescentes, nubecula media infuscatae: nervis similiter atque in tota hac Syrphorum sectione directis.

Obs. A *S. mussitante* quoad structuram clypei non longe recedit haec species. Ad Milesiam vespiformem: antennarum articuli primi longitudine, abdominalisque latitudine aequali et sublineari, prope accedit. Syrphi autem generis rectius habetur, ab Eristale asiliformi Fabr. verisimiliter diversa?

Var. β abdominalis fasciis obsoletis, in exsiccatis vix ullis.

11. *S. laphrifomis* æneo-nigricans, griseo-flavo-hirsutus; abdominalis pedumque basi testacea; femoribus posticis crassissimis subtus spinosis.

M^{as} et FEM. In floribus Crataegi oxyacanthæ Esperöd rarer. In Lärketorp Ostrogothiae D. Zetterstedt — Statura fere praecedentis, at abdomen ovatum et latius. Antennae subporrectae protuberantiae frontali insidentes: articulo ultimo rotundato,

com-

compresso, subflavo. Clypeus in medio impressus, descendens, juxta aperturam distincte elevatus, et tuberculatus, niger, albo-pulverulentus, Oculi nudi, in mare cohaerentes. Thorax non dense hirsutus, aeneo-niger: hirsutie griseo-flava; scutello concolore. Abdomen fuscum, nitidum, non dense pilosum; praeter maculas baseos laterales testaceas, fere immaculatum. Pedes omnes basi pallidi. Femora pilosa; anteriora fusca, simplicia; postica autem valde crassa, incurva, ceteris longiora, subtus praeter pilos dense denticulata. Tibiae pallidae, posticae incurvae. Ungues nigri. Alae ut in S. asilico.

Obs. Hirsutie corporis crebriori et tuberculo clypei a Milesiis primae sectionis, in primis recedit S. laphriformis. Cum genere Syrpho, quoad hirsutiem thoracis densiorem, haud male conveniunt Scaeiva syrphoides et Eristalis lucorum; clypei structura ab eo alioquin recedentes.

** Nervus longitudinalis quartus ante apicem
alae valde incurvatus.

(Articulus antennarum ultimus rotundatus.)

α Seta antennarum plumata.

12. S. intricarius niger luteo-hirsutus, ab domine vel concolore vel ano albo-hirto; striga alarum media fusca.

Fabr. Ent. syst. 4. 281. 11. ♀ Panz. Fn. 59. t. 11. ♀
Eristalis Antl. 252. 3 ♀ Syrphus bombyliformis Fabr. Antl.
227. 12. ♂ Ent. syst. 4. 281. 13. ♂ Panz. Fn. 59. t. 12. (pictura manca) Musca intricaria Linn. Fn. 1800. De Geer Ins.
6. 158. t. 8. f. 10. ♀ vera.

Mas et Fem. In memoribus et in hortis valde frequens, velox et pipiens. — Oculi hirsuti, in mare conniventes. Clypeus niger, griseo-tomentosus, in medio denudatus, apice descendens, obtusus, unituberculatus. Antennae breves, deflexae: articulo ultimo luto, rotundato; seta basi plumata. Thorax opaco niger, supra luteo-hirtus: scutello flavo. Abdomen hirsutie baseos apicis-

cisque in femina alba tectum; in mare hirsutie lutescente, unicore saepius obductum: macula utrinque ad basin testacea. Corpus subtus nigrum: ano albo-piloso. Pedes nigri: basi tibiarum alba. Alae hyalinae: nubecula obsoleta media. Magnitudo Muscae vomitoriae.

13. *S. flavocinctus niger luteo-hirsutus*, abdomine subnudo: segmento secundo macula dorsali utrinque trigona singulisque apicē flavis; striga alarum fuscescente.

Eristalis flavocinctus Fabr. Antl. 232. 5. *Musca nemorum* De Geer Ins. 6. 140. t. 8. f. 19 vera, (non Linn.)

Mas et Fem. Habitat in Svecia valde frequens, velox et pipiens. — Oculi hirsuti, in mare conniventes. Antennae et clypeus ut in *S. intricario*. Thorax niger, undique, at non dense, hirsutus: scutello inani flavo. Abdomen nigrum: macula in utroque latere segmenti secundi trigona, magna, lutea, quae in segmento tertio (praesertim in mare) continuatur. Segmenta praeterea 2. 3. 4 in summo apice terminantur linea flava. Venter basi albus. Pedes nigri: femoribus omnibus apice flavis; posticis elongatis basi quoque flavis. Tibiae flavae, apice nigrae. Tarsi anteriores basi flavae. Alae hyalinae: striga media juxta nervulos transversos fusca, interdum obsoleta, vix ulla.

Var. β . femoribus maxima ex parte nigris.

14. *S. piceus nigro-piceus*, thoracis hirsutie flava tenuiori; segmentis apice tenuissime albis: macula alarum media sub-quadrata saturate fusca.

Voluccella picea Geoffr. Ins. 2.

Mas et Fem. Habitat cum praecedente in Scania rarior, in Svecia superiori frequentior. — Facies et magnitudo *S. flavocincti*. Oculi hirsuti in mare cohaerentes. Clypeus niger, griseo-pubescent: tuberculo elongato denudato. Vextex nigro-pilosus. Thorax niger: hirsutie griseo-flava, minime densa; scutello ferrugineo. Abdomen piceum, parum pubescens: summo margine segmentorum postico albo; rudimento maculae in segmento secundo utrinque luteae. Femora nigra, pilosa; postica elongata basi

basi alba. Tibiae et tarsi basi alba, apice nigra. Alae hyalinae: macula media subquadrata, saturate fusca, in mare magis obsoleta.

Obs. Forsitan mera praecedentis varietas. Marem feminam semper minorem vidimus, a mare S. arbustorum non nisi macula alarum discernibilem.

15. *S. arbustorum* niger luteo-hirsutus; abdominis latere utrinque flavo-maculato, segmentis apice albis; alis immaculatis.

Fabr. Ent. syst. 4. 286. 30. ♂ Eristalis Ant. 236. 17. ♂ Musca Linn. Fn. 1798. ♂ Syrphus Panz. Fn. 14. t. 22. ♀ Eristalis nemorum Fabr. Ant. 234. 10. ♀ Musca Linn. Fn. 1797. ♀ De Geer Ins. 6. 141. ♂ ♀ in observat.

Mas et Fem. In hortis mense Majo et Augusto maxime vulgaris, velox, pendulus, pipiens. — Praecedente semper paullo minor. Oculi hirsuti, in mare adhaerentes. Clypeus dense griseo-tomentosus, non denudatus; inde illum magis aequalem, (vix tuberculatum) et paullo latiore facile putas. Thorax, scutellum et abdomen ut in *S. flavocincto*. Adsunt maculae laterales abdominis trigonae flavae, quae in mare etiam in segmento tertio saepe continuantur. Margo segmentorum posticus plerumque terminatur linea flavo-alba. Venter basi pallidus. Pedes pilosi, nigri: genibus tibiarumque basi albis. Alae hyalinae, immaculatae.

Var. β ♀ maculis thoracis duabus anticis tribusque posteris obscuris, in exsiccata evanescentibus. D. 13 Aug. capta.

Obs. Species 13, 14, 15 varietates unius ejusdemque speciei sine dubio rectius habendae sunt; vix enim nisi magnitudine et colore paullo diverso a se invicem discrepant. Duas per annum generationes verisimiliter quoque constituant; altera tempore florentis Pomonae, in quo frequentior est *S. flavo-cinctus*; altera mense Augusto, in quo *S. arbustorum* vulgatior.

16. *S. similis* antennis plumatis niger, luteo-hirsutus, clypeo tuberculato; macula segmenti secundi utrin-

que fleva, femoribus posticis nigris, tibiis basi late albis; alis immaculatis.

Fem. In hortis Scaniae et Ostrogothiae haud frequens. Magnitudo S. tenacis. Clypeus in medio niger, nitidus, distincte tuberculatus. Antennae nigrae: articulo ultimo rotundato: seta distincte plumata. Oculi hirti. Thorax sat dense luteo-hirsutus, immaculatus: scutello pallido. Abdomen nigrum, nitidum, pubescens: segmento secundo macula utrinque latea, trigona, summo quoque apice reliquorum saepe tenuiter luteo. Pedes albo-pubescentes: femoribus posticis totis nigris, tibiis basi late albis, posticis, vix dilatatis nec distincte ciliatis. Alae hyalinae, vix nisi in puncto costali leviter infuscatae.

Var. α ventre nigro, lateribus basi luteo.

Var. β ventre antice et ultra dimiduum magis albo-hyalinato, segmentis in medio obscuris.

Mas.

Obs. Syrpho tenaci adeo similis est species nuper descripta, ut eundem dices, nisi antennas distincte plumatas observare velles. Tibias posticas praeterea ad basin longius coarctatas et longius albidas, dein simpliciores forsitan videbis. — A Syrpho flavo-cincho, ejusque confinibus parum quoque differt, nisi magnitudine majori, colore antennarum pedumque obscuriore.

β Seta antennarum nudiuscula.

17. S. tenax nigro-piceus, antennarum seta nuda; thorace luteo-subhirsuto, abdominis maculis anticis segmentorumque apice luteis; tibiis posticis incrassatis bifariam nigro-ciliatis.

Fabr. Ent. syst. 4. 288. 36. Panz. Fn. 14. t. 23. 24. Eristalis Fabr. Antl. 238. 24. Musca Linn. Fn. 1799. Musca porcina De Geer Ins. 6. 98. I.

Mas et Fem. Ad aquas fimetarias valde frequens. Larva tenacissima, vix prelo destructibilis. — Species in hac divisione maxima Oculi hirti, in mare cohaerentes. Clypeus dense cinereo-pubescentis; linea media denudata nigra, unituberculata. Thorax

rax et scutellum flavum luteo-pilosa: hirsutie haud densa. Abdomen minus pubescens, piceum: linea apicis segmentorum, maculis trigonis in segmento secundo, fasciaque interrupta in segmento tertio, interdum vix ulla, luteis. Venter fuscus s. luteus: anomalisque mediis nigris. Femora nigra, pilosa; postica elongata, incrassata. Tibiae basi albae, cinereo-tomentosae; posticae incrassatae, subcompressae, in utroque margine nigro-ciliatae. Alao hyalinae, in medio parum infuscatae.

18. *S. cimbiciformis* nigro-piceus, thorace fulvo-hirsuto; abdomine pedibusque immaculatis, femoribus posticis crassissimis; alarum striga media nigra.

Mas. In horto Esperōd Scaniae mense Septembri semel lectus. — Longitudo praecedentis. Clypeus descendens, lateribus griseo-albicans, villis aliquot (non crebris) vestitus; in medio niger, nitidus, unituberculatus. Antennae nigrae: seta ferruginea, nuda. Oculi nudi, in mare connexi. Thorax et scutellum dense fulvo-hirsuta. Abdomen piceum breviter nigro-pubescentis: ventre pallido, postice nigro. Pedes validi, nigri: femoribus inprimis villosis. Femora postica crassissima: tibiis compressis, incurvis, setulis l. pilis brevissimis (non ciliis) vestitis. Alarum striga media nigra sat distincta, nervos transversos cingens.

Fem.

Obs. A *S. tenaci* omnino diversus; corpus enim angustius, oculi minores, thorax hirsutior, pedes crassiores etc.

19. *S. megilliformis* æneo-niger, supra totus fulvo-hirsutus; pedibus nigris, alarum striga media nigra.

Mas et Fem. Ad Upsaliam a D. Haeffner, in Ostrogothia a D. Zetterstedt raro lectus, mense Junio. — Antennae et caput ut in praecedente. Oculi nudi. Corpus magnitudine *S. intricarii*, totum æneo-nigricans et supra dense fulvo-hirsutum, immaculatum, subtus nigrum. Pedes validi, nigri, pilosi: femoribus posticis incurvis, crassissimis, hirsutis: hirsutie apicis nigra.

Ti-

Tibiae posticae compressae, subsulcatae. Tarsi intus fulvo-mican-
tes. Alae fusco-nervosae, juxta nervos transversos infuscatae.

20. *S. apiformis hirsutus niger, scutello abdominis-
que basi albis; ano luteo-hirto.*

Fem. In horto Regio Holmiae, mense Augusto. D. Hæff-
ner. — Facies et magnitudo *S. bombylantis*. Clypeus niger, pù-
bescens, in medio nudus; descendens, tuberculatus. Oculi dense
hirsuti. Antennae breves: articulo ultimo rotundato: seta elong-
ata simplici. Thorax niger, hirtus: scutello albo. Abdomen
basi album, dein nigrum: ano fulvo. Pedes validi nigri: tarsis
posterioribus fulvis. Alae macula media obscura sat dilatata
notatae.

Mas.

Obs. Cave, ne hanc speciem cum *Scaeva syrphoide* con-
fundas.

21. *S. anthophorinus antennis nigris: seta nudiuscu-
la; niger pallide hirsutus: clypei medio nigro, tuber-
culato, abdominis lateribus antice luteis, alarum ma-
cula nigricante.*

Mas et Fem. In Scania mense Mayo minus frequens. —
Statura *S. arbustorum*, cui valde similis; at clypeus in medio
longitudinaliter niger, denudatus, tuberculo sat distincto instru-
itur. Antennæ nigrae: seta pallida, vix nisi nuda. Corpus sat
dense pallide hirsutum, thoracis dorso nigriore; scutello pallido,
hirto. Abdomen subaeneo-nigrum, magis hirsutum quam in *S. intricario*: lateribus anticis secundi tertiique segmenti luteo-
pellucidis, hirsutie vestitis, apice tamen reliquorum vix ut in ma-
re *S. arbustorum* lineato. Pedes nigri et nigro-pubescentes: basi
tibiarum alba. Alae in nervis transversis maculam irregularem
nigram habent sat distinctam.

Var. β macula alarum obsoletissima, vix ulla.

22. *S. aeneus niger nitidus pubescens; corpore imma-
culato, tibiis basi albis.*

Panz. Fn. 82. t. 15 figura manca; at nervus quartus incurvus rite delineatus. (Fabr. Ent. syst. 4. 302. 88. Eristalis Antl. 244. 57?)

Mas et Fem. Ad parietes mense Majo volitans. — Statura S. tenacis paullo minor. Oculi subnudi, grisei nigro-punctati, in mare conniventes. Clypeus albo-pubescent: tuberculo denudato nigro. Thorax niger, nitidus, lateribus in primis griseo-pubescent: scutello nigro. Abdomen supra aenescens, immaculatum, lateribus griseo-pubescent. Pedes nigri: tibiis basi albis; femora postica elongata, subrecta, ceteris parum crassiora. Alae hyalinae: puncto costali nigro; squama alba.

Obs. Musca sepulchralis LINN. Eristalis FABR. ad S. aeneum jam descriptum vix pertinet.

23. *S. tristis* niger subtomentosus, thorace albo-lineato; abdomine aenescente; femoribus posticis crassis incurvis: genubus albis.

Fabr. Ent. syst. 4. 303. 92. Panz. Fn. 82. t. 16 (verus) Eristatis Fabr. Antl. 245. 62.

Mas et Fem. Ad parietes mense Septembri velociter volans et pipiens. Ad Fucos e mare rejectos et putridos Esperöd, sat frequens et apricans. — Praecedente minor eique valde similis. At differt: pubescencia nigriori, lineis thoracis 4-5 longitudinalibus albis, saepe obsoletissimis, femoribusque posticis crassioribus, incurvis. Oculi grisei nigro-punctati, in utroque sexu distantes. Pectus et abdomen aeneo-nigra. Pedes nigri, pilosi, mutici: tibiis basi albis. Clypeus, antennae et alae ut in *S. aeneo*.

24. *S. cryptarum* nigricans, thoracis hirsutie lutea; abdominalis maculis lateralibus trigonis pedibusque luteis, segmentis apice flavis.

Fabr. Ent. syst. 4. 255. 26. Panz. Fn. 90. t. 18. fig. manca. Eristalis Antl. 235. 11.

Mas et Fem. Ad Mösseberg Vestrog. D. Gyllenhal; in Scania D. Zetterstedt, haud infrequens. — Statura S. arbustorum,

rum. Oculi hirsuti, in mare conniventes. Antennae luteae. Clypeus niger griseo-tomentosus; in medio nudus, uni-tuberculatus. Pectus nigrum. Scutellum totum luteum. Abdomen nigrum: pictura flava ut in femina Syrphi arbustorum. Venter vel fuscus vel luteus, postice niger. Pedes simplices, nigri; anteriores basi nigri. Alae hyalinæ.

Var. ♂ femoribus omnibus basi late nigris.

25. *S. floreus* niger thorace flavo-hirsuto, transversim obsolete albo-lineato; abdominis maculis lateralibus trigonis flavis.

Fabr. Ent. syst. 4. 283. 20. Panz. Fn. 14. t. 21 ♂ nimis colorat. Eristalis Antl. 233. 9. Musca Linn. Fn. 1796. De Geer Ins. 6. 100. t. 6. f. 2.

Mas et Fem. In hortis ubique frequens. — *S. pendulo* major. Oculi hirsuti, in mare coliaerentes. Clypeus griseo-flavotomentosus, in medio denudatus, unituberculatus. Antennae nigrae. Thorax undique subflavo-hirsutus; fascia antica, media et postica transversa, interrupta, obsolete albida. Abdomen nigrum: macula segmenti primi et tertii trigona laterali flava. Apex segmentorum 2, 3, 4, flavus. Venter inanis flavus, nigro maculatus. Pedes simplices, nigri: tibiis basi late albis; femoribus posticis longis. Alae hyalinæ: nubecula media.

26. *S. pendulus* antennis nigris, thoracis lineis quatuor abdominalisque maculis lateralibus trigonis flavis.

Fabr. Ent. syst. 4. 282. 17 Panz. Fn. 22. t. 21. ♂ Eristalis Antl. 233. 7. Musca pendula Linn. Fn. 1795. De Geer Ins. 6. 101. 3.

Mas et Fem. In silvis et hortis valde frequens, velox, pipiens, pendulus. — Magnitudo *S. flavocincti*. Clypeus flavedine sericea vestitus: tuberculo oblongo, nigro. Antennae nigrae: seta elongata, flava. Oculi nudi, in utroque sexu distantes. Thorax dorso niger, tomentosus: lineis 2 mediis et lateralibus, longitudinalibus flavo-albidis; scutello flavo. Abdomen subnudum, nigrum: segmentis 2 et 3 macula utrinque majori flava trigona, segmento autem quarto fascia flava interrupta notatis. Venter flavus:

flavus: ano nigro. Pedes flavi: femoribus basi nigris; posticis longis, crassis. Tibiae apice nigrae. Alae immaculatae.

27. *S femoralis* antennis, clypeo æquali, lineis thoracis longitudinalibus abdominisque maculis laterali bus flavis.

Mas et Fem. In paroecia Farhult Scaniae a D. Zetterstedt captus. — *S. pendulo* sat similis, paullo minor. Oculi in utreque sexu distantes. Clypeus pube densissima pilisque luteis vestitus, ad latera oris niger, infra oculos longe descendens, parum coarctatus. Antennæ luteæ. Vertex lutescens, nigro-hirsutus. Thorax niger, luteo-hirsutus: lineis 4 longitudinalibus flavis; intermediis distinctis. Linea autem lateralis cum maculis pectoralibus cohaeret. Scutellum flavum. Abdomen nigrum: segmento basali albo arcuato; macula segmenti 2 et 3 laterum trigona, ut et linea apicis flava; fascia segmenti quarti arcuata interrupta, et apex flava. Pedes flavi, basi nigri; femora postica crassa, nigra, apice flava. Apex tibiarum posticarum una cum tarsis niger.

Obs. A *Milesia* pipiente mox differt: clypeo non ita descendente toto flavo (linea denudata nulla) antennis totis flavis, etc. A *Syrphio* lineato: clypeo obtusiori ut et pictura abdominis pedumque diversa.

28. *S. lineatus* niger, clypeo elongato conico; lineis thoracis maculisque abdominis in mare lateralibus flavis: lunulis segmentorum in semina albicantibus.

Rhingia lineata Fabr. Antl. 223. 2 ♂ Ent. syst. 4. 375. 2. *Rhingia muscaria* Fabr. Antl. 223. 3 ♀. *Musca femorata* Panz. Fn. 20. t. 21. ♀ *Musca transfaga* Linn. Fn. 1848. (*Eristalis versicolor* Fabr. Antl. 233. 8. *Syrph.* Ent. syst. 4. 383. 19. verisimiliter hujus quoque speciei).

Mas et Fem. In Fogelsång Scaniae, mense Junio, et in paroecia Farhult cum praecedente, haud frequens. — Longitudo *S. femoralis*, at angustior. Corpus parum liirtum. Oculi maris cohaerentes. Clypeus infra oculos valde descendens, conicus, fla-

vo-micans. Vertex nigro-hirtus. Thorax opacus, niger: lineis 4 longitudinalibus flavo-albis, scutello flavo. Abdomen nigrum: in mare maculis utrinque segmenti 2 et 3 trigonis flavis, lunulisque oppositis in segmento quarto et ano albicantibus; in femina nigro-opacum: segmentorum 2. 3. 4 lunula utrinque sursum flexa apiceque flavis s. glaucis; at segmentum basale flavo-arcuatum. Pedes utriusque sexus flavi: femorum anteriorum basi tibiarumque apice nigris. Femora postica valde incrassata, in medio late nigra. Tibiae posticae annulo ad basin et ad apicem nigro notantur.

Obs. Clypeus hujus speciei conicus oblique (non ita horizontaliter atque in Rhingiis) extenditur. Directio praeterea nervorum in alis ex omni parte eadem et similis est atque in tota hac Syrphorum sectione. Habitus quoque S. penduli et femoralis. —

Not. MERODON spinipes Fabr. Antl. 197. 5 ♂ a Cl. STURM Norimberg. nobiscum benevole communicatus, ad Familiam Syrphicorum certissime pertinet. — Antennae breves, ovatae: seta nuda. Oculi maximi, arcte cohaerentes, hirsuti. Clypeus declivus, subconvexus, in medio vix impressus, apice nec elevatus nec descendens. Abdomen sublineare. Directio nervorum in alis eadem et similis atque in sectione Syrphi secunda: nervo scilicet quarto longitudinali distincte incurvato. Femora postica incrassata, incurva, dente valido compresso subtus ad apicem armata. Statura igitur corporis pedumque armatura ad Milesiam, directione nervorum in alis ad Syrphum, structura clypei ad Pipizam, in qua species pedibus armatis instructae quoque occurunt, proxime accedit Merodon spinipes, ad Genus proprium et a reliquis nostratis diversum sat apte referendus. —

RHINGIA Os clypeo in conum vel horizontaliter vel oblique porrecto. Antennae deflexae: articulo ultimo subrotundato, basi setigero. Corpus oblongum: nervo alarum quarto longitudinali haud incurvo.

Corpus vel ovatum, vel elongatum, breviter pubescens. Antennae breves: articulo ultimo suboblongo, non orbiculato; seta vel nuda vel plumata. Oculi nudi. Pedes validiusculi.

usculi. Clypeus in R. rostrata horizontalis et longe in conum porrectus; at in reliquis magis oblique descendens, apice antrorum flexus et tuberculatus. Nervus costalis in R. rostrata infra apicem alae producitur, at in reliquis in ipso apice desinit. — Species igitur, quae clypeo gaudent obliquo, cum Milesiis conjugere malleamus, nisi obstant et tuberculum clypei et pluma antennarum, quibus carere debent omnes Milesiae. A Syrphis discrepant structura diversa clypei, nervi costalis alarum extensione, pilositate corporis tenuiori etc.

Imagines flores visitant, vix more Syrphorum pipientes. Larvae in humo lutosa verisimiliter versantur.

* Seta antennarum nudiuscula.

1. R. rostrata thorace nigricante, ore conico, abdome pedibusque testaceis; nervo costali pone apicem alae extenso.

Fabr. Antl 222. 2. Ent. syst. 4. 374, 1. Conops Linn, syst. 2. 1004, 1. Musca De Geer Ins. 6. 130. 19. t. 7. f. 21. 22.

Mas et Fem. Hospitatur passini in floribus Imago. Larvam in stercore bovine observavit D. Reaumur Ins. 4. pag. 233. — Musca vomitoria parum minor. Oculi nudi, in mare arcte cohaerentes. Clypeus in conum porrectum desinens, flavus. Antennae flavae. Thorax pubescens, aeneo-niger, lineis tribus obsoletis albo-tomentosis saepissime notatus. Scutellum et abdomen pubescencia, flava. Pedes simplices, inermes, nigri: genubus tibiarumque apice flavis. Alae hyalinae: nervis ut in prima Syrphi sectione directis, modo nervus costalis paullo pone apicem descendit. Squama vix ulla.

Var. β . abdominis linea media longitudinali, incisuris, et fascia tibiarum nigricantibus.

2. R. bicolor thorace obscure cinereo, sublineato; clypeo tuberculato. abdome pedibusque testaceis, nervo costali cum nervo quarto in ipso apice alae conjuncto.

Mas et Fem. In succo distillante Quercus, mense Julio, ad Lärketorp Ostrogothiae Imaginem legit D. Zetterstedt. — Præcedente paullo minor et R. testaceae affinis. Clypeus oblique descendens, albo-micans, tuberculatus, apice emarginatus. Antennæ deflexæ, flavæ, breves: seta nuda, nigra. Oculi nudi, in mare arcte cohaerentes. Occiput sinuatum et vertex feminæ cinerea, breviter hirsuta. Thorax obscure cinereus, obsolete 4-lineatus. Apex scutelli et abdomen testacea. Pedes testacei, pubescentes: femoribus posticis subincrassatis, subtus brevitor setulosis. Alae hyalinæ: nervo quarto longitudinali in ipso apice cum nervo costali conjuncto. Squama alba, perspicua.

Var. β . scutello toto testaceo.

** Seta antennarum plumata.

3. R. ferruginea pallide ferruginea, abdomine infuscato; nervo alarum quinto versus quartum arcuatim flexo.

Mas et Fem. In Vestrogothia a D. Gyllenhal, in Ostrogothia mense Julio a D. Zetterstedt rarissime lecta. — Inter nostrates maxima, Milesia femorata fere robustior. Oculi nudi, in mare conniventis. Clypeus flavus, longe descendens, apice paullo coarctatus, emarginatus, subtuberculatus. Antennæ flavæ: articulo ultimo obtuso ovato, ceteris longiore; seta distincte plumata. Occiput sinuatum. Corpus oblongum, pallide ferrugineum, subnudum: thorace sublineato. Abdomen dorso infuscatum. — Pedes testacei, validi, setulosi: femoribus posticis elongatis, crassis subtus distinctius at breviter spinulosis. Alae sordide hyalinae, fusco nervosæ: nervo quarto recto in apicem extenso; at nervus quintus ante marginem alae interiorem deorsim est arcuatus, nec ut in R. testacea rectus. Squama alba, sat distincta.

4. R. testacea corpore subnudo, pedibusque testaceis; nervo alarum quinto ad quartum per nervulum rectum recurrente.

Mas et Fem. In Vestrogothia D. Gyllenhal; in Smolandia D. Zetterstedt, mense Junio, in umbellatis cōpulatam legit. — R. rostrata diuidio minor. Clypeus porrectus, subconicus,

cus, albicans, apice emarginatus, subtuberculatus, in medio impressus. Antennae deflexae, luteae: articulo ultimo subrotundato, ceteris non longiore; seta nigra, sub-plumata. Capitulum proboscidis parvum: stipite longa. Oculi nudi, in vertice maris arctissime cohaerentes. Occiput sinuatum. Corpus testaceum, nudiusculum: rudimento lineae duplicatae in medio thoracis, incisurisque nigris. Pedes validi, testacei, apice nigri. Venter albus. Alae hyalinae; Nervus longitudinalis quartus cum nervo costali in summo alae apice coniungitur, angulum acutum cum nervo quinto per nervulum rectum recurrente formans.

5. *R. scaevoides nigra*, antennis pedibusque pallidis; abdomine linearis, brunnescente, per paria macularum flavarum notato.

Fem. In Ostrogothia a D. Zetterstedt semel capta. — Minuta, Scaevas mellinam minorem mentiens; Rhingiae tamen Generis videtur. Caput thorace latius. Clypeus sat longe descendens, subconicus, albo nigrans, sub antennis impressus, dein elevatus et paullo porrectus: linea media denudata nigra, subtuberculata. Antennae rotundatae, luteae: seta saltim basi plumata? Vertex niger nitidus. Thorax aeneo-nigricans scutello concolore, pectore cinerascente. Abdomen lineare, brunnescens: maculis laterilibus quadratis flavis, an semper obsoletis? Pedes simplices pallidi. Alae hyalinae, nervis ut in praecedente directis.

Mas.

Obs. Rhingia lineata Fabr. Antl. 223. 2. (Musca femorata Panz. Fn. 20. t. 24.) et Rhing. muscaria Fabr. Antl. 223. 3, mas feminaque ejusdem speciei: clypeo cris subconico, oblique nec perpendiculariter porrecto, ut est alaruin nervo quarto ante apicem distincte incurvato; in nostra sectione Syrphi secunda optimum facile habent locum.

SÆVA Os clypeo perpendiculari tuberculato apice vix coarctato, nec descendente. Antennæ breviusculæ: seta nuda. Corpus oblongum, nitens, tenuiter pubescens.

Corpus medium, abdomine fornicato vel ovato vel lineari, saepissime albo-flavo fasciato. Antennarum, articulus ultimus rotundatus, raro oblongus, apice semper obtusus. Clypeus saepe margaritaceus, infra oculos plerumque minime descendens, nec ut in Syrphis ad apicem coartatus, sed latitudine aequari praeditus. Oculi maximi, vel nudi vel hirti, in vertice marium arcte conniventes. Thorax in speciebus nostris fere omnibus aenco nitens. Pedes simplices, in paucissimis incrassati et armati. Directio nervorum in aliis eadem et similis atque in Sectione Syrphi prima, paucis modo speciebus exceptis, in quibus nervus quartus longit. paullo arcuatim inflectitur.

Imagines in memoribus aërem sono pipiente implent. In floribus Umbellatarni facile leguntur.

Larvas aliquot aphidivoras descriptis D. DE GEER Mem. des Ins. Tom. 6. Plurasque etiam Scaevae species in hortis culinaribus in primis olivas, larvasque unius alteriusve speciei structura saepe singulari gaudentes, Aphides Olerum devorasse, saepe observavimus.

Not. Segmentum abdominis basale minutum, ab Aucto-ribus omissum, in hoc opusculo primum adpellatur.

* *Majores; abdomine dilatato, subovato.*

- I. *S. syrphoides* antennis porrectis nigra hirsuta: hirsutie scutelli, baseos thoracis abdominisque albida, abdominis media nigra & ani lutescente; clypeo tarsisque flavis.

Mas et Fem. In provincia Calmariensi habitans. D. Zetterstedt.—Syrpho oestraceo non longior, at robustior et latior, eique quoad hirsutiem coloremque sat similis. Structura autem clypei antennarumque longe diversa: Oculi hirsuti, in mare arcte cohaerentes. Antennae totae nigrae, longiusculae, porrectae: articulo ultimo oblongo, inaequali, in medio scilicet dilatato, infinito duplo fere longiore. Clypeus latitudine aequali, infra oculos minime descendens, apice retusus; gibbus s. tuberculatus, pubescens, nitens, flavissimus. Vertex feminae pubescens, obscure canescens. Thorax ad basin capite angustior, niger, dorso nigro-hirsuto: hirsutie brevi. Adsunt pili in antico thoracis, conge-sti,

sti, qui maculam utrinque albidam formant. Scutellum albicans, totum longe albo-hirsutum. Abdomen obtuse ovatum, thorace latius, fornicatum, nigrum: hirsutie baseos longa, alba; dein brevi, nigra, segmentum medium totum occupante fascianque latam nigram formante. Anus albo-lutescens: hirsutie concolore. Venter niger basi albo hirtus. Femora simplicia, pilosa, nigra, apice leviter flava. Tibiae flavae, apice posticarum inprimis late nigrae. Tarsi omnes flavi: metatarso postico elongato. Alae hyalinae, corpore longiores: fascia media abbreviata nigricante.

Obs. A Mulionibus, respectu porrectionis antennarum non longe recedit haec species; at antennæ capite breviores articulum ultimum gerunt magis in equalem. — Syrphis quoque, si statura hirsutiisque corporis respicias, sat similis est; at clypeus infra oculos minime descendit. Quapropter eam in Scæva collocare satius dacimus, notam novi generis sufficientem frustra querentes. Pictura hirsutiei eadem atque in Syrpho oestraceo, antea descripto. Hinc utrum Cel. FABRICIUS in Syst. Antl. sub nomine Eristalis oestracei hanc nostram Scævam respexerit, necne, difficile dictu erit. Mas in Collectione Cl. Zetterstedtii asservatur.

2. *S. conopsea nigra glabra, thoracis linea laterali abdominisque clavati fasciis quatuor flavis; alarum margine exteriori fuscō*

Milesia Fabr. Antl. 195. 29. Mulio Suppl. 559. 6. Syrphus Ent. syst. 4. 297. 69. Syrphus coarctatus Panz. Fn. 45. f. 22.

Mas et Fem. In Scania a Cl. Doct. Hagström, ad Lärketorp Ostrog, a Cl. Zetterstedt capta. — Longitudo Milesiae vesiformis, at multo angustior. Clypeus glaber, flavescens, in medio late niger: tuberculo flavo. Oculi nudi, maximi, in mære arce cohærentes, linea, utrinque verticali in femina, flava. Antennæ fuscae, breves: articulo ultimo rotundato. Thorax niger nitidus: linea utrinque laterali distincta punctisque in ipso late-re flavis. Scutellum flavescens. Abdomen nigrum, nitidum, nudum. Segmentum basale parvum, immaculatum; secundum elongatum, valde coarctatum: linea utrinque obliqua flava, primam constitutente fasciam; segmentum tertium basi coarctatum ibique cin-

cingulo flavo circumdate; quartum et ad basin et in apice cingulum habet flavum; quintum absconditum ad basin gerit cingulum, in apice autem lineolam modo tenuissimam. Anus niger. Pedes simplices, femoribus flavis in medio nigris; at in Mare ferre totis nigris. Tibiae flavae, puncto nigro. Alae brunneo-nervosae, extus longitudinaliter late fuscae.

Obs. *Musca conopoides* Linn. a Cl Panzer citata ad Cerialm clavicornem Fabr. pertinet. — A Milesiis aperte differt nostra *Scaeva conopsea*: clypeo infra oculos haud descendente, et tuberculato; Ad Muliones non male referenda, nisi aliter svaserint antennae.

5. *S. festiva nigra* subnitida, thoracis linea utrinque laterali abdominis fasciis quatuor subrectis interruptis segmentorumque apice flavis.

Eristalis Fabr. Anti. 242. 46. *Syrphus* Ent. syst. 4. 300. 82. *Musca* Linn. Fn. 1812. *Musca citrofasciata* De Geer. Ins. 6. 178. 9.

Mas et Fem. In umbellatis passim obvia. — Magnitudo Mulionis arcuati. Clypeus flavo-corneus, tuberculatus. Antennae breves, flavae, extus rotundatae. Oculi nudi, in mare arcte cohaerentes. Corpus nigrum, subnitidum, parum pubescens: ab domine ovato, supra planiusculo, subtus excavato. Flava sunt: linea utrinque thoracis et macula una alterave in lateribus; apex scutelli, fasciae abdominalis, quae in medio sunt interruptae: prima autem in segmento secundo maculas binas laterales oppositas, interdum trigonas, format. Ceterae fasciae in basi segmentorum sitae. Segmentum vero quartum et quintum praeterea apice terminantur lineola flava. Venter basi fasciisque 2 pellucidis flavus. Pedes simplices, 1 toti flavi l. genibus nigri. Alae extus brunnescentes, poste medium costae vitta nigriori saepius notantur.

Not. Hanc speciem, cum Eristalibus conjugere frustraneum videtur; ad Mulionem melius mandanda, nisi obstaret antennarum structura.

4. *S. alneti* ab domine obscure nigro: maculis bis tribus oppositis subcoequentibus viridi-flavis; pedibus posticis nigris.

Mas

Mas et Fem. In Juniperitis Smolandiae mense Augusto obvia. D. Zetterstedt. In alnetis Esperöd et Karakås mense Sept. velocissime volitans, captu difficillima. — Scæva pyrastri vix minor, ab domine tamen obtusiore. Clypeus in margaritaceus, pubescens, in medio unituberculatus; tuberculo nigro. Antennæ fuscae, breves, ovatae. Oculi nudi, in mare arcte cohaerentes. Thorax æneo niger, pubescens, scutello-flavescens. Abdomen obscurum (vix nitide) nigrum, maculis bis tribus notatum viridibus, quæ fascias tres subinterruptas constituunt. Maculae anticæ oblique; posteriores (interdum triangulares) rectae, saepe coeuntes. Venter viridis nigro trifasciatus: fascia prima tripunctata. Pedes simplices, pilosi, pallidi, basi nigri; postici autem nigri: genibus pallidis. Nervus alarum quartus longitudinalis ante apicem magis incurvatus, quam in reliquis Scævis: curvitate tamen minori, quam in Syrphis secundæ sectionis. — Color macularum laete viridis post mortem in pallidum plerumque mutatur.

6. *S. pyrastri* cœruleo-æneæ; abdominis lunulis bis tribus sursum flexis albis; alis hyalinis.

Fabr. Antl. 249. 3. Syrphus Ent. syst. 4. 305. 102. Musca Linn. Fa. 1817. De Geer Ins. 6. 108. 5. tab. 6. fig. 8. Larva fig. 14.

Mas et Fem. In hortis sat frequens. Larva inter Aphides Pyri, Rosæ. — Inter majores hujus generis adnumeranda. Clypeus albo-margaritaceus (in mortuis flavus) pubescens, tuberculo nudo, nigro. Antennæ fuscae: articulo ultimo obovato. Frons supra antennas dilatata, subelevata, in femina praesertim dense hirsuta. Oculi hirti, in mare arcte conniventes. Thorax cœruleo-æneus: pube in lateribus griseo-pallida; scutello flavo, piloso. Abdomen cœruleo-nigricans subopacum: fasciis tribus albis interruptis; prima e maculis subrectis; secunda et tertia e lunulis sursum flexis. Venter albus, nigro-maculatus. Pedes tenues; anteriores pallidi, basi nigri; femora postica et tarsi nigra. Alae hyalinae, minime coloratae. — Albedo fasciarum post mortem in colorem luteum plerumque abit; scutellum quoque fuscescit.

6. *S. ribesii* thorace fuso-aeneo immaculato; abdominis fasciis tribus rectis flavis: prima interrupta.

Fahr. Antl. 248. 1. Syrphus Ent. Syst. 4. 304. 103. Musca Linn. Fn. 1816. De Geer Ins. 6. 103. 4. t. 6. Larva fig. 5. 4.

Mas et Fem. In Umbellatis hortorum ubique vulgaris. Larva inter Aphides Ribis; teste D. De Geer. Inter Aphides quoque plantarum silvestrium larvam versari, a frequentia in nemore Esperid Quasa, ubi aërem sono pipiente, una cum aliis Syrphicis, aestate serena implet, facile conjectur. — Magnitudo valde variat; *S. pyrastri* interdum non minor. Clypeus flavomargaritaceus, tuberculatus. Antennae flavae, subrotundatae. Macula infra antennas nigra in feminis saepius adest. Oculi vel nudati, vel hirsuti, in mare conjuncti. Thorax pubescens, fuscocaeneus; scutello flavo. Abdomen minus pubescens, nigruin, flavotrifusciatum: fascia primi interrupta; reliquae integræ, rectæ. Segmentum ultimum, saepe absconditum, linea tenui flava terminatur; hinc ipse apex abdominis flavus. Venter viventium saepe flavius, in mortuis nitro maculatus. Pedes vel toti flavi, vel basi cum femoribus posticis nigri. Alae individuorum majorum ad costam interdum paullo infuscatae.

Var. ♂ ♀ thorace caeruleo-atro, nitidissimo. (Minor.)

7. *S. bifasciata* aeneo-nigricans: antennis, scutello, abdominis fasciis duabus prima interrupta pedibusque flavi.

Labr. Antl. 248. 2. Syrphus Ent. syst. 4. 305. 101.

Mas et Fem. Praecedente, cum qua minus frequens habitat, etiam minor eique sat similis. Color tamen thoraci aeneus forsitan nitidior, abdominalisque maiis caeruleseps; nec nisi duie adsunt fasciae flavae, quarum anterior in segmento secundo et tritio lateralibus, distantibus, trigonisque in Mare, acqualibus approximatis in femina. Fascia autem posterior ad basin segmenti tertii sita, vix interrupta, saepe angustior. Caput ut in *S. ribesii*: oculis vix nisi nudis, antennisque flavis Venter basi flavius, apice nigro bimaculatus. Pedes flavi, tarsis posticis nigris.

8. *S. glauca* thorace fusco, abdomine atro: fasciis tribus albo-glaucis pellucidis, antennis strigaque alatum costali nigris.

Eristalis Fabr. Antl. 243. 49. Syrphus Ent. syst. 4. 504.

97. Panz. Fn. 59. t. 17. Musca Linn. Fn. 1845.

Mas et Fem In silvis Scaniae et Ostrogothiae mense Julio minus frequens — Magnitudo S. pyrastris. Clypeus valde gibbosus, corneus, parum descendens. Antennae nigrae, obovatae. Oculi vel nigri vel minas hirsuti, in mare coadunati, in femina linea nigra disjuncti. Corpus totum pubescens: pube thoracis aeneo-fusci lute-cente. Scutellum pallidum, vacuum. Abdomen opaco-atrum albo & glauco-fasciatum: fasciis pellucidis in medio fere interruptis; prima prope basin latior, reliquae ad basin segmenti 3. 4. angustiores. Anus interdum, impramis in mare vivi, glaucus. Venter utriusque sexuo trifasciatus. Pedes simplicios lutei, basi nigris senioribus posticis fere rotis nigris. Lineola in costa alarum nigra, sat distincta.

9. *S. tricincta* aeneo-nigra: fasciis abdominalis tribus, prima obsoleta, flavo-pellucidis; scutello tibiisque luteis; antennis senioribusque nigris.

Mas et Fem. In hortis Scaniae olvia. In Westrogothia quoque lecta a D. Dalman — Statura S. ripesii. Clypeus flavocornutus: linea media nigra. Antennae nigrae, oblongae, obtusae. Oculi subhirti, in mare arce approximati, in femina interstitio glabra, nigro distantes. Thorax aeneo nigricans, pubescens: scutello luteo, (in exsiccatis rufescente, nec, ut in speciebus super allatis, albidente). Abdomen obscurer nigrum pubescens: vittis 2 oppositis, in medio segmenti secundi, minutis, fasciam primam obsoletam forinatis, fasciisque duabus flavis pellucidis, rectis; quarum anterior paullo latior vel interrupta vel contigua basin segmenti tertii, posterior autem basin segmenti quarti cingit. Segmenta analia apice quoque flavescent. Venter basi maculis binis viridibus (in vivis) fasciisque duabus flavis, quae dorsalibus opponuntur, notatur. Femora nigra, apice tibiisque flavis. Vitta alarum costalis nigra sat distincta.

Var. β . Ventris basi fasciisque tribus flavis (in exsiccatis).

10. *S. albo-striata* thorace æneo-cæruleo-escente: lineis duabus dorsalibus approximatim albis; fasciis abdominis quatuor flavis subinterruptis.

Mas et Fem. In umbellatis hortorum Scaniae mense Julio minus frequens. — Statuta præcedentium. Clypeus flavus: linea media nigra. Antennæ obscuræ; in vivis subtus et intus lutescentes. Oculi hirsuti, in femina interstitio nigro glabro disjuncti. A Scaeva ribesii differt: colore thoracis æneo-cæruleo lineisque duabus brevibus in medio dorsi longitudinalibus, saepè obsoletis. Macula thoracis utrinque albicans. Scutellum luteum. Fascia abdominis prima semper interrupta; ceteræ vel interruptæ, vel leviter cohaerentes, non arcuatae, at in medio quasi ad-surgententes. Fascia autem quarta in segurento vaginante et abscondito saepius latet: lineola apicis ejusdem segmenti saepè flava. Vitta alarum costalis nigra, tenuis. Pedes simplices, flavi; femoribus posticis in medio sat late nigris.

11. *S. arcuata* æneo-nigra, abdominis lunularum tribus paribus fasciatim sursum arcuatis flavis; scutello subænescente.

Mas et Fem. In horto Esperd Scaniae rarius lecta, mense Julio — Praecedente non minor. Clypeus flavus: tuberculo s. linea media nigris. Antennæ flavae: articulo ultimo rotundato. Oculi l. nudi l. hirsuti, in femina interstitio nigro disjuncti. Thorax æneo-niger, pubescens: scutello flavo-ænescente. Abdomen nigrum, nudiusculum: lunulis subarcuatis 3 et 3 oppositis, similiter atque in Scaeva pyrastri, sursum flexis, flavis. Ejusmodi quoque lunulae in segmento anali adsunt, at absconditae; lineola tamen apicis flava manifesta. Venter saepius flavo-bifasciatas. Pedes flavi, basi nigri. Femora interdum maxima ex parte nigra, et annulus tibiarum niger. — A *S. pyrastri* aperte differt: magnitudine minori, coloreque corporis minime cæruleo etc. A *Scaeva ribesii*: arcubus abdominis sursum flexis etc. Color scutelli in exsiccatis aenescit, semper fuscior.

12. *S. olitoria* thorace immaculato vel æneo vel cæruleo; abdomine nigro; fasciis tribus subinterruptis scutelloque pallidis.

Mas et Fem. In hortis frequens. Larva inter Aphides Brassicæ oleraceæ versatur, in medio mensis Augusti exclusa. — Summa Scaevæ albo-striatae affinitas. Differt tamen: thorace non albo-lineato fasciisque abdominis latioribus, omnibus interruptis, sursum subflexis. Clypeus margaritaceus: tuberculo nigro. Antennarum articulus ultimus obtuse ovatus, fuscus. Oculi nudi, in femina interstitio æneo verticali disjuncti. Thorax æneo caeruleo; scutello pallido, vix nitido. Abdomen nigrum: fascia segmenti 2, 3, 4 in medio dorsi magis minusve interrupta, et media in primis subarcuata. Segmenta ultima apice flava. Venter pallidus, maculis in medio 3 l. 4 nigris. Pedes vel toti flavi vel basi nigri. — Fasciae in vivis albae, post mortem flavescere. An Musca pīnastri De Geer Ins. 6. 113. 6 tab. 7. fig. 6? — Muscæ transfuga Linn. Fauna 1818: "abdomine cylindrico", ad aliam speciem sine dubio referri debet, in sectione subsequeente collocanda.

13. *S. hyalinata* thorace scutelloque æneo-nitidis, abdome nigro: punctis 2 anticis maculisque 4 dorsi subquadratis, in mare contiguis, flavis.

Mas et Fem. In floribus passim obvia. — Magnitudo *S. ribesii*. Clypeus caeruleo-margaritaceus, polline l. pube albæ tectus: tuberculo denudato, distincto. Antennæ flavae l. fuscae, obovatae. Oculi nudi, in mare arctissime cohaerentes: macula supra antennas caerulea. Thorax et scutellum ænea, nitidissima, immaculata, parum pubescentia. Abdomen obtuse ovatum, planiusculum, nigrum, basi plerumque caeruleo; maculis quatuor dorsalibus magnis quadratis, in mare confluentibus, in femina distantibus, punctisque duobus in segmento secundo oppositis flavopellucidis. Pedes simplices pallidi, basi nigri. Alae immaculatae.

14. *S. nectarea* thorace æneo, abdominis fasciis quatuor flavis: prima interrupta, secunda tertiaque duplicita.

Fahr.

Fabr. Antl. 253. 22. Syrphus Ent. syst. 4. 309. 116. Panz.
Tn. 82. t. 19 fem. Musca balteata De Geer Ins. 6. 116. 17. Mu-
sca alternata Schranck Ins. Austr.

Mas et Fem. Ubique frequens. — Scaevas ribesii non
longior, at paullo angustior. Clypeus margaritaceus, pubescens.
Antennae rotundatae. Oculi nudi, in mare conjuncti. Thorax
obscure aeneus, longitudinaliter obsolete albo lineatus. Abdomen
nigrum, sublineare: fascia antica interrupta; dein fasciae duae
duplicatae, ita scilicet, ut singula e linea tenui et e fascia latiori
in margine laterum coeuntibus constet. Apex quarti segmenti li-
neatus; at fascia quinti segmenti vaginantis vel saepe latet vel
anum flavum reddit. Pedes plerumque toti flavi.

** Minores: corpore subangustato.

15. S. umbellatarum thorace immaculato, scutello
albo; abdome nigro: maculis bis quatuor rectis,
tarsis omnibus simplicibus.

Fabr. Antl. 250. 9. Syrphus Ent. syst. 4. 307. 107.

Mas et Fem. Hospitatur in floribus, haud infrequens.
— Individua minorâ Scaevae ribesii longitudine aequiparat, at an-
gustior. Clypeus albicans: apice lineaque media denudata, s. tu-
berculo tantum nigris. Antennae vel nigrae vel dimidiato-nigrae.
Oculi nudi, interstitio verticali in fennia nigro. Thorax aeno-
caerulescens, immaculatus, scutello albo. Abdomen nigrum, ob-
longum, lineare: maculis utrinque quatuor rectis, oppositis, al-
bis, fascias interruptas constituentibus; at ultimum macularum
par juxta anum saepius absconditur. Venter in vivis totus fere
albus. Pedes vel pallidi, vel fusi: femoribus saepe nigris, genu-
bus semper pallidis. — Raro occurunt individua exsiccatâ, ab-
domine nigro immaculato praedita. —

16. S. guttata thorace aeno: punctis duabus posticis
albis; abdome nigro: maculis oppositis quadratis
albis.

Mas et Fem. In silva Esperô Scaniae et in Ostrogothia
varius habitans. — Praecedente plerumque minor. Clypeus albo-
mi-

micans: tuberculo distincto vel concolore vel nigro. Oculi nudi, in mare arte conniventes; regio supra antennas alba nigro-pilosa. Antennae nigrae extus albae. Thorax pubescens, aeneo-nitens, puncto supra scutellum gemino albo notatus. Latera pectoris albo-maculata alboque villosa. Scutellum album. Abdomen lineare thorace paullo angustius, opaco-nigrum: maculis dorsalis bus 3 et 3 subquadratis albis. Segmentum anale maculas abscondit. Hinc modo tria macularum paria manifesta. Pedes albi: femoribus posterioribus ex maxima parte saepe nigris; tarsis simplicibus.

17. *S. barbifrons nigra*, fronte verticeque maris nigro-barbatis; abdomine macularum duobus paribus flavo-albis.

Mas In Scania semel capta. — Magnitudo Scavvae melillae. Caput thorace latius, barbatum; oculi tamen nudi. Clypeus niger, nitidus, unituberculatus, pubescens. Antennae nigrae, rotundatae. Oculi cohaerent: interstitio supra antennas valde barbato. Corpus nigrum, nigro-pubescens: scutello livido. an in vivis flavo? Abdomen sublineare, opaco-nigrum: macula in segmento 3 et 4 utrinque lateraliter flava. Pedes nigri, simplices, in basi tibiarum pallidi.

Fem.

18. *S. cincta clypeo pollinoso*, thorace immaculato-aeneo: lateribus argenteis; scutello flavo; abdomine lineari nigro: fasciis quatuor flavis, prima interrupta; tarsis simplicibus.

Mas et Fem. In silvis Scaniae obvia. — Clypeus marginatus, pollinosus: tuberculo denudato nigro, feminae saepius pallido. Antennae flavae, rotundatae, extus interdum nigrae. Oculi nudi: interstitio verticali feminae aeneo-nigro. Thorax pallide aeneus: lateribus argenteis, albo-pilosis; at in mortuis albo maculatis. Scutellum flavum. Abdomen in utroque sexu nigrum, lineare: fascia prima interrupta, quarta in mare obsoleta s. abscondita. Pedes vel tarsi flavi, vel femoribus posticis ex maxima parte obscuris variantes; Tarsi maris antici simplices. — A Soaea-

va menthastrī differt: magnitudine saepius majori thoracis-
que lateribus non flavis, sed una cum pectore argenteo-mican-
tibus.

19. *S. albimana* thorace scutelloque æneo-caeruleis;
abdomine nigro: maculis bis quatuor l. flavis l. glau-
cis; tarsis albis, anticis in mare dilatatis.

Fabr. Antl. 253. 23.

Mas et Fem. Habitat passim, in hortis sat frequens. —
Magnitudo variat; vel Scaeva cincta, vel *S. mellina* non major.
Clypeus in majoribus individuis pollinosus, in minoribus caeruleo-
aeneus nitidissimus: tuberculo valido. Antennae ovatae, nigrae,
subtus interdum flavae. Oculi nudi: interstitio feminæ aeneo.
Thorax et scutellum aenea, nitida, pubescentia. Abdomen dorso
maculis 4 et 4 quadratis vel flavis vel glaucis obsoletis notatum;
at ultimum macularum par in primis in mare saepius absconditum.
Segmentum anale, ad basin in individuis minoribus, caerulescens.
Venter margine flavus, in minoribus totus metallicus. Pedes an-
teriores pallidi, postici ex maxima parte nigri. tarsis albis. Me-
tatarsus pedum anticornutus dilatatus in mare cum apice tibiarum,
et maculae abdominis fascias interruptas formantes hanc speciem
a *Scaeva cincta* et *mellina* mox distinguunt.

20. *S. mellina* thorace scutelloque æneo-fuscis; abdo-
mine maculis oppositis luteis; tarsis omnibus simpli-
cibus.

Fabr. Antl. 251. 12. *Syrphus* Ent. syst. 4. 308. 110. Mu-
eca Linn. Fn. 1821. De Geer Ins. 6. 117. 8.

Mas et Fem. In hortis ubique frequens. Larva inter
Aphides teste D. Linn. — Parva, aenea, nitida. Clypeus vel fu-
sco-aeneus vel pollinosus distincte tuberculatus. Antennae ob-
tusae vel obscurae, subtus flavae, vel flavae, apice nigrae. Oculi
nudi. Thorax undique aeneo-caeruleo-nitens: scutello concolore.
Abdomen in mare angustius, nigrum: maculis oppositis quadratis
luteis, in dorso approximatis; in mare saepe tribus, in femina
plerumque quatuor paribus. Venter luteus, in mare infuscatus.
Pedes

Pedes pallidi, modo femoribus fere totis nigris, modo femorum tibiarumque medio tarsisque posticis nigris. Alae fuscescentes.

Var. β . Fem. thorace scutelloque caerulescentibus, abdome maculis oppositis subtrigonis. luteis. *Scaeva scalaris* Fabr. Antl. 252 14. *Syrphus Ent. syst.* 4. 308. 112. (Panz. Fn. 45. t. 20. mas hujus varietatis?). Habitat cum varietate α ; cui ex omni parte similis, nisi maculas abdominalis minus quadratas, magisque trigonas, marginem non prorsus attingentes diceres. In utraque varietate variat numerus macularum 2, 3, 4 parium. Lineae anales flavae vel adsunt vel deficiunt. Venter in vivis quadratim luteo-maculatus, in mortuis obscure-metallicus.

Var. γ ♀. abdomine immaculato, obscuro; antennis obtusis, cum specie sequente vix confundenda.

21. *S. ambiguus* thorace scutelloque concolore, abdome nigro-nitente immaculato; antennarum articulo ultimo oblongo.

Fem. A Nobil. D. Dalman e Westrogothia nobiscum amicissime communicata — Statura et summa praecedentis similitudo. An specie vere diversa? — Clypeus pollinosus, thorax et scutellum aeneo-caerulescentia, nitidissima. Abdomen aeneo-nigrum, in specimen nostro exsiccato immaculatum. Pedes pallidi, tibiarum anteriorum apice, femorum posticorum medio una cum tibiis tarsisque obscuris. — Antennae obscurae subtus pallidae, magis elongatae, articulo scilicet ultimo non rotundato sed magis oblongo, ut et metatarsus posticus, ni valde fallimur, crassior hanc a *Scaeva mellina* diversam imprimis indicant?

Mas.

22. *S. rosarum* clypeo thorace scutelloque aeneoscentibus; abdome opaco-nigro; maculis duabus majoribus mediis flavo-pellucidis; pedibus obscuris.

Fabr. Antl. 251. 11. *Syrphus Ent. syst.* 4. 307. 109. (*Syrpha noctilucus* Panz. Fn. 72. t. 24. fem. vera).

G

Mas

Mas et Fem. In floribus Scaniae rario, in copulae capia. — Magnitudo S. umbellatarum. Caput nigrum: clypeo tuberculato, nitido; oculis nudis in mare connexis. Antennae oblongatae, obscurae. Thorax obscure aeneus, pubescens, scutello caerulecente. Abdomen planiusculum, lineare, opaco-nigrum: punctis 2 minutis prope ad basin in feminina obsoletissimis, in mare vix ullis. At in medio abdominalis duas adsunt: maculae quadratae maiores, fasciam distinctam in utroque sexu formantes, et ponet has maculas puncta duo vix conspicua flava, saepius glauca. Pedes simplices, nigri: genibus omnibus tibiisque anterioribus palpidis. Alae subnigricantes.

23. *S. ocyymi*, clypeo thorace scutelloque aeneoscentibus, abdome maculatum rufescente: basi anaque nigris; pedibus luteis, nigro-maculatis.

Fabr. Antiq. 252. 18. Syrphus Ent. syst. 4. 309. 114. Panz. Fn. 82. t. 18.

Mas et Fem. In pratis umbrosis villa Esperi Scaniae una cum praecedente, a D. Zetterstedt rarius lecta. — Statura et similitudo Scaevae rosarum; at species ab ea verius similiter distincta. Clypeus niger, albo-pollinosus, in medio denudatus, nitens. Oculi nudii, in vertice mari arcte cohaerentes, in femina paulo distantes, similiter atque in Sc. rosarum. Antennae nigrae, extus obtusae. Thorax aeneo niger nitidus, parum pubescens scutello caerulecente. Abdomen planum, sublineare, ex maxima parte vel rufum, vel. rufo-maculatum: ano nigro, ventre rufo. Pedes in mare ex maxima parte obscuri, modo femororum anteriorum apex tibiarumque omnium basis lutea; at pedes in femina lutei: tarsis omnibus nigris. Adest quoque interdum pons medium femorum posticorum annulus niger, et alter in medio tibiarum. Alae nigricantes. — Mas hujus speciei a mare S. rosarum et colore abdominalis et metatarso antico incrassato distinguitur; femina autem vix nisi colore pedum ex maxima parte luteo dignoscitur. Pictura abdominalis praeterea variabilis.

24. *S. menthastris* nigricans, clypeo albo, pectore argento; abdome lineari, in mare subcylindrico; fasciis sub-quatuor; scutello-pedibusque albo-flavissimis:

Fabr.

Fabr. Antl. 251. 13. Musca Linn. Fn. 1819. De Geer Ins. 6. 117. 8. (Scaeva scripta Fabr. Antl. 252. 17. Linn. Fn. 1826. Mas major).

Mas et Fem. In Svecia vulgaris. Larva inter Aphides. Pupa alba, conica, foliis plantarum uliginosarum adfixa, mense Augusto exclusa. Imago in copula saepius deprehensa. — Majora individua mascula species hujus generis maiores longitudine equiparant, at longe angustiora corpore scilicet subcylindrico. Minora individua utriusque sexus Sc. mellinae magnitudinem vix attingunt. Clypeus margaritaceus, exsertus, nudus. Antennae pallidae, breves, obtusae. Oculi nudi, in femina interstitio verticali aeneo disjuncti. Thorax aeneus, pubescens: linea utrinque, maculis laterum cōglomeratis et scatello flavissimis. Pectus argenteum. Abdomen nigrum, elongatum, in mare angustius quam in femina: fasciis tribus maculisque analibus, vel interruptis vel integris. Apex genitalium in mare penicillatus. Pedes flavi, simplices. Alae immaculatae, in mare ab domine breviores. — Fasciae abdominales in femina semper angustiores s. tenuiores quam in mare, saepiusque interruptae. Ejusmodi varietates feminineae, cum masculis majoribus, ab domini fasciis integris praeditis, in copula deprehensae.

ERISTALIS. Os clypeo tuberculato, impresso, apice vix coarctato, infra oculos descendente. Antennæ breves: seta nuda. Corpus glabrum, ovatum: abdome planiusculo.

Corpus medium, pubescens: pube thoracis brevi rariori, abdominis saepe vix illa. Clypeus corneus vix unquam margaritaceus, infra antennas impressus, vel tuberculo medio distinctioni vel apice exerto tuberculum formahte instructus et infra oculos descendens, (at in Erist. milesiformi, tuberculi loco, carina adest elevatior, longitudinalis). Apertura oris ovata, antice enarginata, ascendens. Antennæ breves: articulo ultimo lamelliformi saepissime rotundato, rarius oblongo. Oculi vel nudi vel hirti, mediocres; in vertice mari arcte conjuncti, raro distantes: interstitio tamen angustior quam in femina. Pedes sat validi, parum pubescentes, saepius simplices; in Erist. milesiformi incrassati, armati. Directio nervorum in aliis similis at-

atque in Scaevis; Nervus costalis scilicet desinit in summo alae apice. Nervuli prope marginem interiorem transversi areas discoidales terminantes, vel recti et subcontigui, vel incurvati et inaequales. Alae incumbentes. Apex scutelli vel obtusus, et pilosus, vel attenuatus et quasi marginatus, nudus.

Imagines in Umbellatis saepe colliguntur. Larvae vel in succo ex arboribus rirosis extillante, vel in terra humida verisimiliter versantur. — Aliam igitur vivendi rationem habent Eristales quam Scaevae. —

* *Discolores: abdomine picto.*

Areae alarum discoid. apice subaequales.

1. *E. lucorum thorace obscuro, luteo-hirsuto; abdome basi albo-pellucido, apice obscuro; alarum macula media nigra.*

Fabr. Antl. 241. 37. Syrphus Ent. syst. 4. 291. 46. Musca Linn. Fn. 1803.

Fem. In Scania et in Ossroethia rarissime obvia. — Magnitudo Scaevae ribesii; hirsuties autem thoracis densa et similis atque in Syrpho intricario. Clypeus tuberculatus, exsertus, in medio denudatus niger: lateribus albidis, pilosis. Antennae rectae, nigrae: articulo ultimo oblongo obovato. Oculi hirsuti. Thorax, vertex et scutellum flavum dense luteo-hirsuta. Abdomen dense pubescens, basi late album, medio nigrum, apice interdum caerulescens. Pedes nigri: tibiarum anteriorum basi late pallida. Alae macula media dilatata nigra notatae: nervis transversis, areas discoidales terminantibus, fere rectis et contiguis.

Mas.

2. *E. ruficornis nigra, scutello flavo; abdome fulvotomentoso; alis fusco-punctatis.*

Fabr. Antl. 243. 50. Syrphus Ent. syst. 4. 501. 85. Panz. Fn. 77. t. 20 fem. male picta.

Mas et Fem. Habitat in Svecia passim, mense Julio exclusa succum arborum avide sugens. Pupani in terra ad radices

ces arboris sauciatae invenit Cl. Zetterstedt. — Est e majoribus bujus generis — variat tamen magnitudo. Clypeus flavus, exsertus, tuberculatus, immaculatus. Antennae rotundatae, luteae. Oculi hirsuti, in mare cohaerentes. Thorax niger, pubescens: lineis 4 griseis longitudinalibus, interdum obsoletis. Setae laterales rigidie. Scutellum totum luteum. Abdomen ovatum, aeneo-nigrum, immaculatum, at pube sat densa, ciliisque apicis segmentorum, fulvo-aureis vestitum. Pedes vel toti flavi, vel basi nigri: tibiis in medio saepe nigris. Alae flavedine costali, et maculis s. punctis mediis. juxta nervos transversos nigris adspersae.

3. E. semirufa nigra abdominis, apice tarsisque luteis; alis immaculatis.

Fabr. Antl. 243. 51. Syrphus Ent. syst. 4. 301. 85 Musca fallax Linn. Fn. 1812. De Geer Ins. 6. 127. 17.

Mas et Fem. In Vestrogothia D. Gyllenhal. In Ostrogothia; D. Zetterstédt et alibi apud nos mense Junio obvia. — Statura praecedentis. Clypeus flavus, gibbosus, superne paullo impressus; subcarinatus. Antennae flavae, basi plerunque nigrae. Oculi nudi, in mare contigui. Thorax niger, pubescens, setis lateralibus vix ullis, scutello concolore, apice piloso, non setoso. Abdomen ovatum: segmento 1, 2 nigris, in mare 3, 4, 5 in femina 4, 5 confertissime luto-tomentosis. Pedes nigri, genubus tarsisque luteis. Alae immaculatae: nervis obscuris.

4. E. lateralis nigra nitida, antennis abdominis lateribus ventreque pallidis; scutello immaculato.

Mas et Fem. In Scaniae pratis rario. — Musca domestica paullo longior. et feie habitus Milesiae silvarum, magnitudine tamen multo minori. Clypeus niger, in lateribus albo-pollinosus, infra antennas impressus, in apice elevato tuberculum ostendens haud aliter atque in Syrpho laphriformi. Antennae rotundatae: articulo ultimo luteo: seta nuda. Oculi nudi, in mare cohaerentes, in femina interstitio nigro, punctis 2 ad oculos albis notato, parum distantes. Thorax punctulatus aeneo-niger; vix pubescens, nec pilosus, modo maculis 2. anticis albo-micantibus, obsoletis, notatus. Scutellum totum nigrum, apice submargini-

ginatum, attenuatum. Abdomen nigrum: segmentis 2 et 3 lateribus pallidis. At in femina vix nisi segmentum secundum utrinque pallidum videtur. Venter pallidus ano nigro. Pedes crassi, nigri: femoribus subtus brevissime spinulosis, tibiisque posticis incurvis. Tarsi ad partem inferiorem aureo sericei. Alae basi parum pallidae: macula media fusca vix conspicua. Directio nervorum hujus omnino generis et divisionis. — Structura clypei ad divisionem illam Syrphi, in qua laphyiformem collocavimus, pertinet; at corpus minime hirsutum. A Milesiis aperte differt: praesentia tuberculi clypei. A Rhingiis: clypeo in conum non descendente.

5. E. Milesiformis nigra nitida, scutelli apice maculisque abdominalis lateralibus luteis; femoribus posticis incrassatis, dente armatis.

Mas et Fem. Habitat rario cum praecedente. In pratis Karakas Esperöd mense Julio a D. Zetterstedt lecta. — Statuta et magnitudo praecedentis. Clypeus exsertus, descendens in medio elevatus, subcarinatus, infra antennas vix impressus; albo-micans: carina saepe denudata, apice elevationi, loco tuberculi. Antennae rotundatae, obscurae. Oculi nudi, in vertice maris conjuncti, in femina intersticio parvo, opaco disjuncti. Thorax niger nitidus non setosus: maculis duabus humeralibus, pectore, maculaque utrinque ante scutellum albo-micantibus, facile determinandus. Scutellum nigrum, apice attenuatum, in margine apicis tenuiter pallidum. Abdomen planiusculum, lineare: maculis 2 et 2 quadratis, lateralibus rufescensibus; segmento ultimo nigro, maculatim albo-micante. Venter pallidus: ano nigro. Pedes nigri: genubus tarsisque anterioribus pallidis. Pedes postici in utroque sexu nigri, femoribus valde incrassatis, dente unico angulato apicis armatis, tibiisque incurvis. Alae immaculatae: nervis ut in speciebus hujus divisionis directis. — Species sanc distincta, si armaturam et crassitatem pedum, habitumque totius respicis, ad Milesiam secundae sectionis referri debet. Obstant autem clypei structura et infra oculos extensio. Neque ad Pipizam eandem rationem apte mandari potest.

6. E. maculata nigra subopaca, antennis flavis; maculis abdominalis oppositis cinerascentibus.

Mas

Mas et Fem. Mense Junio in Esperid Scaniae rarius obvia; in Abusa a D. Bened. Fr. Fries lecta. — Musca domestica paullo longior. Clypeus griseo micans, sub antennis valde impressus; apice descendens porrectus, gibbosus: tuberculo saepius denudato nigro. Antennae rotundatae: articulo ultimo luteo. Oculi nudi, in mare conjuneti, in femina parum distantes: vertice nigro. Thorax muticus niger, ad certum lumen brevissime griseo-pubescent: maculis humeralibus albo-micantibus. Pectus griseo micans. Scutellum nigrum, non attenuatum, nec setosum. Abdomen oblongum, opaco-nigrum, pubescens: maculis oppositis in mare 3 et 3 subquadratis distinctioribus, in femina 4 et 4 obsoletis, fere confluentibus, e pube grisescente ortis. Pedes nigri, simplices. Alae infuscatae: nervis ut in antecedentibus directis.

** Unicolores: ab domine obscuro, immaculato.

♂ Apice scutelli immarginato, setuloso.

7. E. grossa æneo-nigra, thorace scutello abdominisque lateribus luteo-villosis; tibiis flavo-albidis.

Fem. In horto Lundae mense majore a D. Zetterstedt semel capta. — Hujus generis forte maxima, Syrphum tenacem statura aequiparans. Clypeus niger, nitidus, tuberculo ordinario valido supra os armatus, sub antennis paullo impressus. Antennae rotundatae, nigrae. Oculi hirsuti: interstitio verticali nigro, griseo-hirsuto. Thorax et scutellum aeneo-sentia, hirsutie grisea rariori vestita. Abdomen nigrum, nitidum, pubescens, antice utrinque luteo hirsutulum. Segmenta ultima nigro-villosa. Pedes nigri; pilosi: tibiis fere totis flavo-albis. Alae antice pallide nervosae: nervis transversis arearum discoidalium prope marginem incurvatis.

Mas.

8. E. flavipes æneo-nigricans vertice feminæ levigato; antennis pedibusque totis luteis.

Syrphus flavipes Panz. En. 54: t. 10?

Fem.

Fem. Habitat Holmiae; D. Häffner; in Smolandia. D. Boheman, Signif. et studii entomologici amator eximius. — Praecedente paullo minor. Clypeus niger, nitidus, distincte tuberculatus. Antennae rotundatae, luteae. Oculi hirti: hirsutie interdum desperita. Vertex pubescens, latus, subpunctulatus, transversim non striatus. Corpus nigruin, nitens, ad certum lumenis situm pube crebriori tectum; scutello concolore, immarginato, ab domine ovato. Pedes lutei: femoribus pilosis. Alae ad basin luteo-nervosae. Figura Panzeri citata colore corporis nimis viridem indicat.

Mas.

9. E. variabilis atra, nitida; abdomine elongato, sublineari; pedibus concoloribus, alis obscuris.

Syrphus Panz. Fn. 60. t. 10. ♂ (Eristal. ater Fabr. Antl. 246. 66?)

Mas et Fem. Flores. Scaniae, Wermlandiae etc. frequenter visitans. — Longitudo Syrphi arbustorum, at corpus multo angustius, et in hac divisione sat magna; variat tamen saeppe minor. Clypeus niger nitidus: tuberculo ordinario distincto, et altero minori ad aperturam. Antennae nigrae rotundatae. Oculi hirsuti in mare arcte cohaerentes. Thorax et scutellum æneoatra, tomentosa, pilis, vix setulis instructa. Abdomen depresso, opaco nigrum, in lateribus imprimis pubescens. Pedes nigri, tomentosi, immaculati. Alae nigro-nervosae, obscurae. — Copulata haud raro occurrit haec species mense Julio.

10. E. mutabilis æneo-nigra; abdomine elongato linearis, genubus pallidis.

Mas et Fem. Habitat cum praecedente, frequens. — Semper brevior et tenuior, eique valde similis, at in copula seorsim observata. Clypeus et antennae, ut in praecedente. Oculi vel nudi vel subhirti, in mare connexi. Corpus aeneo-nigrum, leviter pubescens. Pedes nigri: genubus pallidis. Alae nigredine vix tinctae. Variat magnitudo. Tibiae quoque interdum flavae: anulo medio nigro; et tarsi pallidi: articulo ultimo nigro. Vix differt, nisi colore genuum, in vivis pallidiori.

11. E. coemeteriorum cæruleo-atra, nitida, anten-nis pedibusque nigris; abdomine depresso, ovato; vertice transversim non striato; pedibus nigris.

Fabr Antl. 246. 65. Syrphus Ent. syst. 4. 303. 94. Panz. Fn. 82. t. 17. (Musca Linu. Fn. 1812 ?)

Mas et Fem. Habitat ubique frequens, flores Umbellatarum mense Julio sedulo visitans, cadaverum vix unquam edax. — Clypeus, et antennae ut in Erist. variabili. Oculi, (an semper nudi?) in mare connexi, in femina disjuncti: interstitio verticali laevigato, nec transversim striato. Abdomen depresso, ovatum, nec ut in E. variabili, elongatum: ventre in vivis ad basin virescente. Pedes nigri. Alae juxta basin saepius pallide nervosae.

Var. β ♂ ♀ alis nigricantibus, nigro-nervosis.

Var. γ . alis brunnescentibus; magnitudine majori.

12. E. vernalis æneo-atra; antennis tibiisque luteis; vertice transversim non striato.

Mas et Fem. In Scania tempore Veris praesertim sat frequens. — Statura praecedentis. Clypeus niger, nitidus: tuberculo magno, distinctissimo. Antennae rotundatae: articulo ultimo luteo, in exsiccatis saepe obscurō. Oculi ferruginei, saepe hirsuti, in mare connexi, in femina disjuncti: vertice laevigato. Corpus nigrum, nitidum, pubescens. Pedes nigri: genubus tibiarumque apice luteis; antici toti interdum flavi. Abdomen maris plerumque angustius, feminae magis ovatum, crassius.

13. E. scutellata æneo-nigra antennis, scutelli apice tibiisque luteis.

Fem. In pratis Esperöd Scaniae, Åräs Wermalandiae minus frequens. — Praecedenti affinis ejusque forte mera varietas? Clypeus et antennae ut in Erist. vernali. Vertex laevis. Oculi nudi, (an semper?) Corpus nigrum, nitidum, pubescens: apice

scutelli setoso, flavo. Pubes in lateribus abdoninis subalbicans. Venter basi pallidus (in vivis). Pedes nudiusculi, ad basin saepe flavi: tibiis ex maxima parte luteis. Alae immaculatae.

Mas.

B. Apice scutelli attenuato, nudiusculo.

(Areae alarum discoidales apice inaequales.)

14. E. solstitialis æneo-nigricans, oculis rufis; antennis pallidis; vertice feminæ transversim interrupte striato; pedibus nigris.

Mas et Fem. In Umbellatis pratorum Scaniae, tempore solstitiali longe frequentissima. — Musca domestica parum major. Clypeus nitens, sublaevis, latus, sub antennis impressus, albido-micans, versus apicem late gibbus, parum s. vix descendens. Antennæ rotundatae, flavae. Oculi nudi, in vivis rufi, maris arcte connexi, feminae late distantes: interstitio verticali transversim et interrupte striato. Corpus aeneo-nigrum, punctulatum, maris paullo pubescens; feminae nudiusculum; scutello vel concolore, vel caerulescente, in mare parum pubescente, in femina nudo. Abdomen dorso opaco-nigrum: membrana laterali pallida. Pedes nudiusculi, nigri. Alae magis minusve nigricantes, impositae.

Var **B.** ♂ antennis nigris, clypei tuberculo paullo magis elevato; an hujus?

15. E. viduata æneo-nigricans, clypei apice adscendente, vertice feminae sublævigato; antennis pedibusque nigris.

Musca Linn. Fn. 1852.

Fem. In Scania minus frequens. — Habitus omnino praecedentis, at oculi nudi, in vivis vix rufi? — Clypeus in medio retusus: apice adscendente, nec aliter tuberculatus. Antennæ rotundatae, obscurae. Oculi nudi, in femina vertice lato, vix striato disjuncti. Corpus aeneo-nigricans, nitidum, parum pubescens.

bescens; scutelli apice depresso, subpiloso; abdomine ovato, plano. Pedes toti nigri. Alae in medio plerumque nigredine obsolete tinctae. — An species a sequente diversa?

Mas.

16. E. metallica æneo-virescens, pedibus concoloribus; clypei apice adscendente; vertice feminæ transversim interrupte striato.

Fabr. Antl. 246. 67. Syrphus Ent. tyst. 4. 303. 95.

Mas et Fem. In gramine pratorum Esperöd, mense Junio et Julio copiosissima, in copula saepe capta. — Musca domest. fere minor. Clypeus caerulescens, laevis, descendens, in medio retusus, apice porrecto adscendente tuberculum constituens. Antennæ exsertæ, nigrae: articulo ultimo magno, rotundato. Oculi nudi, subrufi, in utroque sexu distantes: distantia tamen in femina latiori, transversim interrupte et perspicue striata. In mare stria modo unica integra adest. Corpus unicolor, parum s. vix pubescens, metallicè nitens: scutello apice depresso-attenuato. Alae hyalinae; squama alba, ciliata. — Cum Nemotelis confundi vix potest, nec debet.

17. E. nobilis ænea, scutello aureo-cærulescente; antennis oblongis, pedibus obscuris.

Mas et Fem. Habitat cum praecedentibus mense Julio minus frequens, in copula observata. — Inter nostrates minima, praecedente saepe duplo minor, eique sat similis, nec nisi structura antennarum diversa oculisque in mare connexis distinguenda. Clypeus enim in medio retusus apicem habet paullo adscendentem. Oculi nudi: interstitio verticali in femina subtiliter interrupte striato. Antennæ in vivis subius pallidae: articulo ultimo elongato, sublineari, apice tanien obtuso. Thorax aeneus, punctulatus, vix tomentosus: scutello aureo caeruleo, apice attenuato, nudo. Abdomen ovale, dorso nigro-opacum, planum, subitus nitidum: pedibus concoloribus. Alae in medio subobscuræ.

Var. β. scutello thoraci concolore.

PIPIZA Os c'ypeo æquali, haud impresso, vix infra oculos descendente. Antennæ porrectæ: seta nuda. Corpus oblongum: abdomine incurvo.

Corpus vel medium vel minutum, punctulatum, pubescens, nitidum. Clypeus infra antennas convexus, (nec impressus) apice truncatus non coarctatus, raro emarginatus et subdescendens. Nec nisi in prima specie apicem gerit subporrectum, tuberculum quasi formantem. Antennarum articulus ultimus vel oblongus et sublincaris, vel rotundatus. Oculi maximi vel nudi, vel hirsuti, in mare connexi. Abdomen fornicatum, inflexum Pedes validi, vel omnes simplices, vel postici incrassati. Directio nervorum in alis plerumque eadem et similis, atque in Eristalibus.

Metamorphosis haud rite nota. Imagines in floribus, praesertim in locis montosis et editoribus, hospitantur. Intra digitos deprehensae sonum saepius edunt pipientem. Inde nomen generis a πιπίζειν mutuatum.

Differt Pipiza a Milesia et ab Eristale: clypeo convексiori, infra oculos haud impresso, magisque æquali etc.

* Pedes simplices.

1. P. atra cæruleo-atra immaculata, abdomine ovato; nervo alarum quarto ad tertium circulatim flexo.

Mas. In Ostrogothia a D. Zetterstedt semel capta. — Magnitudo et facies omnino P. noctilucae. Clypeus niger, pilosus, infra antennas convexus, dein ante apicem vix impressus, at in apice paullo elevatus, subdescendens. Antennæ ovatae, obscuræ. Oculi hirsuti, in mare arcte connexi. Corpus atrum, nitidum, distincte pubescens, at vix punctulatum. Pedes validi, inermes, pubescentes, nigri: genubus anteriorum vix pallidis. Alae hyalinae. Directio nervi quarti longitudinalis, aream terminantis, magis in flexa magisque semicircularis, quam in Specie proxime subsequente. An hujus generis? —

Fem.

2. *P. noctiluca nigra abdomine ovato: maculis duabus baseos flavo-pellucidis.*

Musca Linn. Fn. 1814. *Syrphus rosarum* Panz. Fn. 95. t.

21. (*Eristalis* Fabr. Antl. 247. 69?)

Mas et Fem. In floribus passim, sat frequens. — *Musca domistica* parum minor. Clypeus oculorum longitudine, non tuberculatus, convexus, parum retusus; niger griseo-pubescent. Antennae nigrae: articulo ultimo ovato, in femina saepe rotundato. Oculi hirsuti, in mare arcte connexi. Corpus nigrum, punctulatum, pubescens: scutello vix attenuato; abdomine fornicate, incurvo, nigro: punctis s. maculis binis in segmento secundo oppositis, flavo-pellucidis; interdum vix conspicuis et in exsiccatis saepe nullis. Venter in vivis basi virescens. Pedes nigri, pilosi: genubus saepe pallidis tarsisque sericeis. Femora postica ceteris crassiora et longiora, subtus non spinosa. Alae infuscatae: macula media nigriori, interdum nulla. — Figura Panz. l. c. hanc speciem prodit, magnitudine tamen majori excepta. — *Eristalis lugubris* Fabr. Antl. 246. 64. huc forsitan pertinet: abdome scilicet immaculato. Descriptio autem l. c. nimis incompleta.

3. *P. 4-maculata nigra abdomine ovato: maculis 2 & 2 oppositis flavo-pellucidis.*

Syrphus 4-maculat Panz. Fn. 86. t. 19.

Mas et Fem. Habitat cum praecedente, minus frequens. — Statura omnino *P. noctilucae* ejusque mera varietas? At maculae in segmento secundo tertioque oppositae, oblongae flavae quatuor, et alae vix maculatae. Antennae vel pallidae vel obscurae, rotundatae. Venter pallidus. Pedes vel obscuri vel pallidi: femoribus saepius nigris. Variat abdome fere immaculato.

4. *P. campestris æneo-nigricans abdomine antennisque sublinearibus; clypeo obscuro non prominulo; genubus albis.*

Mas et Fem. Habitat in campis sterilibus prope Stens-hufvud Scaniae, mense Julio, frequens. — Praecedentibus paullo mi-

minor. Clypeus truncatus, nitens, pubescens, in vivis sericeomicans, minime porrectus. Oculi hirsuti, in mare connexi. Color corporis, praesertim thoracis aenescens, pube grisea intermixtus. Corpus punctulatum. Scutellum apice attenuatum. Pedes obscuri simplices: genibus albis. Alae vel immaculatae vel in medio infuscatae. Areae discoidales terminantur nervis valde incurvis.

Var. β . punctis duobus in segmento secundo flavo-pellucidis. Rarissime obvia, speciem diversam minime indicans.

5. *P. tibialis nigricans* abdomine non strigato antennisque linearibus; clypeo albo prominente; tibiis albidis.

Mas et Fem. Habitat in Vestrogothia: D. Gyllenhal; in arvis montosis Scaniae rarer. — *P. campestri* minor et hujus familiae forsitan minima. Caput magnum thorace latius. Clypeus albo-micans, in medio linea denudata nigra saepe notatus; ante oculos exsertus, gibbosus, vix tamen tuberculatus. Antennae obscurae: articulo ultimo elongato, angustato, porrecto. Oculi oblongi, vix nudi, in mare connexi. Corpus punctulatum, subpubescens, obscurum, lineare: macula thoracis laterali e pilis albis composita, quae interdum adest, scutello unicolo, abdomine saepissime immaculato. Femora nigra: apice tibiisque albis. Alae hyalinae. Halteres albissimi.

Var. β . macula abdominis una alterave rufo-pallucida; rarius obvia.

6. *P. albifrons nigricans*, abdomine transversim e pube alba strigato antennisque linearibus; clypeo albo vix prominulo; tibiis albidis.

Mas et Fem. In campis sterilibus cum praecedente prope Stenshuvud Scaniae lecta. — Summa *Pip. tibialis* similitudo, at paullo major in primis differre videtur: clypeo magis aequali, nec ita prominente. Praeterea scutelli apex plerumque testaceus, et abdomen strigis oppositis e pube albicante, transversis, saepe detritis notatur. Antennae, oculi, pedes et alae ut in praecedente, cuius forte mera varietas robustior et melius explicata.

Var. β . macula abdominis rufo-pellucida; rarissima.

** Femora postica crassa, subarmata.

7. *P. sabulonum æneo-nigra linearis, abdomine rufo: strigis dorsalibus albis.*

Syrphus mixtus Panz. Fn. 60. f. 8?

Mas et Fem. In pascuis aridis et arenosis, mense Julio, prope ad urbem Engelholm et Stenshuvud Scaniae juxta terram velociter volans, captu difficilis. — Magnitudo et habitus Pipizae campestris. Clypeus nitens parum pubescens, aequalis, apice sinuatus. Antennæ obscurae: articulo ultimo rotundato, seta porrecta. Oculi nudi, maris ad basin antennarum conjuncti, feminæ interstitio aequali disjuncti. Corpus lineare: scutello attenuato, marginato. Thoracis lineaæ 2 dorsales albae, obsoletæ. Abdomen thorace non latius, rufum: strigis bis tribus sericeo albis obliquis, oppositis, saepe obsoletis. Pedes nigri: genubus albis, tarsis nigro-annulatis. Femora postica incrassata, ad apicem subtus denticulata.

8. *P. strigata æneo-nigricans, linearis; abdominis stri: gis dorsalibus albis.*

Mas et Fem. Habitat in Vestrogothia; D. Gyllenhal; at in Scania cum praecedente haud frequens. — Statura omnino *P. sabulonum*, saepe robustior. Clypeus albo-micans, aequalis; apice sinuatus. Antennæ rotundatae, albissime micantes. Oculi nudiusculi, ut in praecedente. Corpus obscurum, aenescens, sub-tomentosum: scutello attenuato, postice crenulato. Strigæ abdominis 3 et 5 impressæ, obliquæ, albae; interdum detritæ. Pedes nigri, pubescentes: genubus pallidis. Femora postica incrassata, ad basin subtus setosa, an denticulata? Alae hyalinae, nervis ut in conspeciebus directis.

ADDENDA: *Syrphici* pag. 15.

CEPHALOPS.

- 1—2. *C. aucta opaco-nigricans: nervulo infra aream alarum discoidalem anteriorem excurrente.*

Mas

Mas et Fem. In gramine paludoso pratorum Esperòd
 a D. Zetterstedt, mense Julio, rarius lecta. — Statura et summa
 affinitas Cephalopis pratorum Corpus maris opaco-nigrum, distincte
 pubescens, feminae nigrum, griseo-variegatum; abdominis scilicet
 segmentis apice albicantibus. Pedes corpori concolores: genibus
 parum pallidis, pulvillisque in femina majoribus quam in mare
 albis. Alae hyalinae: area anteriori, (quae in apicem alae ex-
 tenditur), duos quasi angulos prope nervum transversum ordi-
 narium formante, et nervulo brevi, infra aream excurrente aucta.
 — Mas ano obtuso, absque appendice; femina appendice
 anali sub ventre longe inflexa, similiter atque in C. pratorum, in-
 struitur.

Not. Species certe dubia, ulteriori examini subjicienda.
 Mera forte varietas monstrosa Cephalopis pratorum! Etenim
 hac in specie, longe frequentiori, et saltim in alterutro ejus sexu,
 haud raro observatur augmentum quoddam, licet breve et minus
 notabile, numerum nervorum ordinarium et solitum, paullo ex-
 cedens. — At in Cephalope aucta, utroque in sexu, aug-
 mentum adest simile, nervulus scilicet infra aream excurrens, et
 praeterea villositas maris crebrior et longior, quam in Cephal.
 pratorum.

Obs. In toto Dipteronum Ordine non nisi rarissi-
 me occurrit, sive per defectum, sive per excessum, ejusmodi
 nervorum in alis monstrositas. — De termino illo, quo tendines
 alarum, nervorum nomine, designamus, disputare,
 nullius momenti existimamus.

S U P P L E M E N T U M 2.
DIPTERORUM SVECIÆ.

Fam. 8. STRATIOMYDÆ

SARGUS.

2 — 3 *S. flavipes æneo-virescens*: abdomine cupreо, pedibus flavis.

Sargus flavipes Meig. Dipt. 3. 108. 5. tab. 25. f. 14.

Mas. & Fem. Hospitatur in foliis fruticum Wadstenæ Ostrog. D. ZETTERSTEDT. — *Sargo cuprario* adeo similis, ut eandem diceres speciem, nisi obstaret color pedum diversus. — Corpus quoque similiter atque in *S. cuprario* coloratum atque constructum, in utraque specie tenuiter & parcissime pallide pubescens, oculis nudis, in femina magis distantibus, juxta interstitium verticis & prope oculos puncto utrinque albissimo instructum, colore thoracis æneo-viridi abdominalisque cupreо pictum. Pedes autem in *S. flavipede* sæpius toti pallidi: femoribus interdum paullo infuscatis. Alæ nigredine paullo tinetæ: macula costali fuscionis, interdum obsoletissima.

Not. Specimina a nobis illustrata statura corporis plerumque angustiori quam in *S. cuprario* gaudent. In Scania, ubi frequentissime occurrit, *S. cuprarius*, pedibus nigris maxima ex parte pictus, *S. flavipedem* jam descriptum nondum invenimus.

Fam. 9. SYRPHICI.

SYRPHUS (Seta antennarum nuda).

12 — 12. *S. regulus* fulvo-hirsutus: abdominis fascia media, antennis pedibusque nigris.

Fem. Habitat in prædio Hjularöd Scan. mense Mayo; teste nobil. Inventore C. W. KÖNIG. — Statura & magnitudo *Syrphi muscitantis*; eique primo adspectu ita similis, ut eandem diceres speciem. Different tamen in primis & structura & colore antennarum. — Os descendens. Clypeus subconicus, infra antennas paullo impressus, dein paullo gibbosus: apice autem non gibbo; antice opacus, integumento pallido obductus, nec denudatus: lateribus nigris. Oculi paullo distantes, vix nisi nudi. Regio stemmatum nigra. Antennæ tuberculo prominulo nigro insertæ, magis porrectæ & longiores quam

in *S. mussitante*, nigricantes: articulo ultimo rotundato, intimis vix longiori: seta longa, pallida. Thorax æneseens, supra dense fulvo-hirsutus: scutello concolore, fasciculo thoracis utrinque lateralí e pilis densis pallidioribus. Abdomen ad basin pallide hirtum, in apice fulvo-hirtum, in medio, pro diverso luminis situ, vel leviter fulvo-hirtum, vel fascia latiori nigra nitida quasi vestitum. Venter niger. Pedes nigri, validi, tenuiter pubescentes. Alæ similiter nervosæ, atque in *S. mussitante*: nubecula in medio costæ & altera ad apicem latiori & obsoletiori, nigricante.

Mas.

PIPIZA.

6 — 7. *P. lateralis* “oculis hirtis nigra, abdomine atro lateribus rufo, strigis utrinque tribus obliquis albis“.

Pipiza lateralis ZETT. Act. Holm. 1819, p. 83.

Mas & Fem. In Oelandia ad Glömminge in pascuis siccis in eunte mense Julio, rarer inventa a D. ZETTERSTEDT. — “*P. sabulum* duplo major, eique affinis; at ab ea distincta: hirsutie oculorum abdominisque pictura rufa. Corpus nigrum pilosum. Clypeus æqualis, haud prominens, infra oculos minime descendens, niger, dense albo-villosus: villositate maris longiori. Antennæ exsertæ: articulo ultimo dilatato, rotundato, apice tamen magis truncato quam in conspeciebus. Vertex antice pilis albis, postice nigris vestitus. Oculi maris connexi. Thorax niger, dorso obsolete albo-bilineatus, scutelli apice crenulato. Abdomen atrum: strigis 3 albis oppositis, sursum flexis: lateribus segmenti secundi in mare, secundi, tertii & quarti in femina rufis: ano maris obtuso, feminæ acuto. Pedes nigri: tibiis anticis ad basin rufis. Femora postica valde incrassata, subtus pro receptione tibiarum profunde sulcata, ad dimidiam partem dupliciter denticulata. Tibiae incurvatae. Alæ hyalinæ, similiter atque in confinibus nervosæ“. Collectio ZETTERST.

Not. Familiam *Syrphicorum* in 25 Genera distribuit Cl. MEGEN, differentias a structura antennarum dissimili inprimis querens, figurisque adcuratissimis illustrans. Facile tamen accidit, ut, in tanta Generum multitudine unius ejusdemque Familiæ, species, & conformatioe aliarum corporis partium, & vivendi ratione maxime affines, a se invicem divellantur, novisque nominibus & inusitatibus iterum salutentur.