

ANNUAIRE
DU
MUSÉE ZOOLOGIQUE
DE
L'ACADÉMIE DES SCIENCES DE RUSSIE.

TOME XXIII.


1918—1922.

AVEC 124 FIGURES DANS LE TEXTE.

RÉDIGÉ PAR

A. Białyński-Birula.

ÉDITION DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES DE RUSSIE.



PETROGRAD.

1922.

ЕЖЕГОДНИКЪ
ЗООЛОГИЧЕСКАГО МУЗЕЯ

РОССІЙСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.

ТОМЪ ХХІІІ.


1918—1922.

СЪ 124 РИСУНКАМИ ИЪ ТЕКСТЪ.

ИЗДАНЫЙ ПОДЪ РЕДАКЦІЕЮ

А. А. Бялыницкаго-Бирули.

ИЗДАНИЕ РОССІЙСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.



ПЕТРОГРАДЪ.

1922.

1482(2)

Напечатано по распоряженію Россійской Академіи Наукъ.

Декабрь 1922 года.

Непрерывный Секретарь, академикъ *С. Ольденбургъ*.

Россійская Государственная Академическая Типографія.

500 экз.

De Syrphidarum (Diptera) speciebus duabus
novis e Rossiâ europaeâ.

Auctore

A. Stackelberg.

(Fig. 2 in texto)

[Штакельбергъ, А. О двухъ новѣихъ видахъ мухъ изъ сем.
Syrphidae. (съ 2 рис. въ текстѣ)].

(Academiae oblatum d. 20 Maji m. 1920).

***Liogaster nigricans* sp. nov.**

Vena transversa subapicali medio subfracta, arcuatim flexa, cum vena longitudinali cubitali angulum rectum formante, colore nigricante, vix olivaceo nitente, in ♂ fronte prominente, epistomate in medio tuberculato, antennarumque articulo ultimo



parvo ab omnibus speciebus palaearticis generis *Liogaster* facile distinguitur.

♂. Caput nigrum; fronte prominente, circiter trientem latitudinis capitis aut nonnihil minus occupante, glabro, parce punctato, nitido, pilis nigris brevibus disperse induto, foveola longitudinali supra antennas impressa; epistomate infra antennas strigulato, griseo pollinoso, in medio tuberculato, infra oculos

modice descendente, margine oris nonnihil antrorsum producto, nudo; oculorum marginibus anticis pilis brevibus albidis, limbo postico regionis occipitalis pilis nigris indutis; antennis nigris, articulo ultimo rotundato, parvo. Thorax et abdomen nigra, parce punctata, nitida, pilis brevibus griseis induta, pilis in lateribus et apice abdominis nonnihil longioribus; scutello apice marginato. Pedes nigri, simplices, pilis griseis induti. Alae subhyalinae, disco plus minusve infuscato, stigmate fusco; vena transversa subapicali medio subfracta, arcuatim flexa, cum vena longitudinali cubitali angulum rectum formante; squamis sordide albidis, halteribus fuscis. Long. corp. 5,5 mm., long. alae 5 mm.

Hab.: Rossia centralis: Gremjatshea, distr. Dancovensis, prov. Rjasanensis, 6. VI. 908, ♂ (A. SEMENOV-TIAN-SHANSKY leg.) Rossia meridionalis: Tauria, prope Sympheropolin 23, 28. VI. 99 ♂ et ♀ (BAZHENOV leg.); Belbek, prope Sevastopolin 18. V. 97 ♂ (N. KUZNETZOV leg.).

♀. ♂ similis, sed fronte nonnihil latiori, ad latera levissime transversim subsulcato, epistomate non tuberculato, apice reflexo abdomineque magis rotundato distincta. A ♀ *Ch. viduatae*, *Ch. macquarti* etc., quibus valde similis, vena transversa subapicali medio subfracta facile distinguitur.

***Chrysogaster jaroslavensis* sp. nov.**

Antennis nigris simulque alis basi flavidis ab omnibus speciebus palaearoticis generis *Chrysogaster* distinguitur.

Caput nigrum, fronte angusta, trianguli aequilateralis instar, nitente, sat ruditer, sed disperse punctata, supra antennas foveolis 2 instructa, quarum altera, immediate supra lunulam supraantennalem, sulcum transversum, circiter trientem latitudinis frontis occupantem formante, altera, a prima valliculo transverso separata, fossulam ovalem longitudinalem praebente; oculis cohaerentibus, spatio ter minore, quam altitudo frontis et circiter aequo longitudinis trianguli ocellaris; epistomate infra antennas excavato, medio tuberculato, margine oris antrorsum producto, parte superiore pube grisescenti, ad ambo latera tuberculi mediani usque ad marginem ulteriorem tuberculi descendente, vestito; genis antice usque ad librationem marginis ulterioris tuberculi mediani ascendentibus, griseis pilisque concoloribus indutis, infra oculos nigris, nitentibus; oculorum limbo postico nigro, parte

superiori griseo pollinoso; occipite nigro; capite pilis albidis, vertice nigris intermixtis, tecto; antennis nigris, brevibus, articulo ultime transverso, seta basi nonnihil incrassata. Thorax modice punctatus, aeneo-micans, scutello in parte posteriore impressione transverso, apice marginato; thorace pilis griseis, in pleuris dilutioribus longioribusque tecto. Abdomen nigrum, medio tergitorum 2, 3 et 4 opacum; tergito primo, tergitorum 2 — 4 marginibus posticis, tergito 5-to toto, limbo laterali abdominis sicut et ventre toto aeneo-micantibus; abdomine pilis superne brevibus incumbentibus nigris, inferne lateribus apiceque longioribus erectis griseis tecte. Pedes nigri simplices, aeneo-nitentes, pilis albidis tecti; coxis griseo-pollinosis. Alae hyalinae, flavidae, unicolores, basi usque ad apicem cellulae discoidalis venis flavidis, ulterius brunneis instructae; stigmatate luteo; vena transversa subapicali ultra (supra) medium arcuatim flexa, cum vena longitudinali cubitali angulum rectum formante; squamis albidis, halteribus sordide albidis, capitulo obscuriore.

♀. Similis ♂, sed statura minus elongata oculisque distantibus distincta. Fronte latā, ad latera quadri-sex-sulcata, ruditer, sed parce punctata; epistomate infra antennis excavato, apice valde reflexo. Abdomen rotundatum, aenescenti-nigrum, totum pilis albide-flavis vestitum, disco subopacum, tergito 4-to margine postice mediorum leniter elevato, deorsum recurvato, tecti instar tergitem 5 subdevexo. Reliqua, ut in mare. Long. corp. 7 mm., long. alae 6 mm.

Rossia centralis: Berditzyno, gubernium et districtus Jaroslavensis 22, 26, 27, 28. V. 1908 in floribus *Barbareae* 3 ♂, 6 ♀ (leg. A. ZHURAVSKY); in eodem loco 2, 7, 13. VI. 1908 I ♂, 3 ♀ (leg. A. JACOVLEV).

